

## Glicerinski čepići — 10 kom

1 g \_\_\_\_\_ glicerol  
2 g \_\_\_\_\_ glicerol

**Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke.** Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

### UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Glicerinski čepići i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Glicerinske čepiće
3. Kako upotrebljavati Glicerinske čepiće
4. Koji su neželjeni učinci Glicerinskih čepića
5. Kako čuvati Glicerinske čepiće
6. Dodatne informacije

### ŠTO SU GLICERINSKI ČEPIĆI I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Glicerinski čepići sadrže glicerol koji nakon primjene u završni dio crijeva lokalno potiče pražnjenje crijeva (laksativ). Glicerol povećava sadržaj vode u stolici, čime se stolica omekšava, te blago potiče pokretljivost crijeva, što olakšava pražnjenje. Glicerinski čepići primjenjuju se za kratkotrajno liječenje povremenog zatvora (opstipacija), te u slučaju neredovite, tvrde stolice uz osjećaj nepotpunog pražnjenja (konstipacija). Također se primjenjuju u stanjima kada nije moguće primijeniti sredstva za pražnjenje crijeva kroz usta te za pražnjenje crijeva prije određenih dijagnostičkih ili medicinskih postupaka.

### PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI GLICERINSKE ČEPIĆE

#### Nemojte upotrebljavati Glicerinske čepiće:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.

Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu

- ako imate jake bolove u trbuhu nepoznatog podrijetla praćene mučninom i povraćanjem jer to mogu biti simptomi ozbiljnijih stanja kao što su začepljenje (opstrukcija) crijeva ili crijevni zastoj (ileus)

#### Budite oprezni s Glicerinskim čepićima ako:

- bolujete od srčanog zatajenja, dehidracije ili bubrežnih bolesti
- bolujete od upalnih bolesti crijeva
- imate hemoroide

Prije primjene Glicerinskih čepića obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Glicerinski čepići namijenjeni su za liječenje povremenih i lakših zatvora. Ako je potrebno svakodnevno korištenje laksativa, potrebno je utvrditi uzrok konstipacije ili opstipacije.

Kod dojenčadi i djece koja se hrane majčinim mlijekom ili unose malo tekućine i vlakana, neredovita stolica može biti normalna, ali razdoblje dulje od 3 dana može izazvati bol.

#### Upotreba Glicerinskih čepića s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

#### Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Glicerinske čepiće nemojte koristiti u prvom tromjesečju trudnoće. Glicerinski čepići smiju se primjenjivati od drugog tromjesečja trudnoće i tijekom dojenja po preporuci liječnika ili ljekarnika.

#### KAKO UPOTREBLJAVATI GLICERINSKE ČEPIĆE

Glicerinske čepiće uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako upotrebljavati Glicerinske čepiće posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

DOB	DOZA
Dojenčad i djeca do 6 godina	1 Glicerinski čepić za djecu
Djeca od 6 do 12 godina	1 Glicerinski čepić za odrasle
Djeca starija od 12 godina i odrasli	1-2 Glicerinska čepića za odrasle

U slučaju neodgovarajućeg odgovora kod djece starije od 2 godine mogu se upotrijebiti 2 Glicerinska čepića za djecu (1 g) ili 1 Glicerinski čepić za odrasle (2 g). Čepiće je potrebno zadržati u rektumu barem 15 minuta kako bi došlo do djelovanja lijeka. Djelovanje nastupa tijekom 15 do 60 minuta od primjene čepića.

#### Način upotrebe čepića:

- operite ruke toplom vodom i sapunom prije i nakon umetanja čepića u rektum
- izvadite čepić iz ovojnice
- uložite čepić u otvor rektuma
- čepići nisu namijenjeni za upotrebu na usta

Glicerinski čepići ne smiju se upotrebljavati dulje od 7 dana.

#### Ako primijenite više Glicerinskih čepića nego što ste trebali

Kod nekontrolirane primjene Glicerinskih čepića može doći do poremećaja elektrolita i dehidracije. Tada je potrebno prekinuti primjenu čepića i javiti se liječniku radi nadoknade tekućine. Također, može doći do poremećaja funkcije crijeva te navikavanja crijeva na ovakav način pražnjenja.

#### KOJI SU NEŽELJENI UČINCI GLICERINSKIH ČEPIĆA

Poput svih lijekova, Glicerinski čepići mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

**Moguće nuspojave**

Ako se prilikom primjene Glicerinskih čepića javi alergijska reakcija praćena osipom i crvenilom kože, svrbežom, oticanjem lica, kapaka ili jezika te otežanim gutanjem ili dođe do krvarenja iz završnog dijela debelog crijeva prestanite s primjenom čepića i javite se liječniku.

Povremeno može doći do reakcije preosjetljivosti u obliku nadražaja sluznice rektuma, grčevite boli, osjećaja nelagode i lokalne iritacije.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

**KAKO ČUVATI GLICERINSKE ČEPIĆE**

Glicerinske čepiće čuvajte u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Glicerinski čepići se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

**DODATNE INFORMACIJE****Izgled Glicerinskih čepića i sadržaj pakiranja**

Glicerinski čepići su bezbojni do blago zamučeni, bez mirisa. 10 čepića u PVC/PE supoformi, u kartonskoj kutiji s uputom.

**Sastav:**

1 Glicerinski čepić za djecu sadržava 1 g glicerola

1 Glicerinski čepić za odrasle sadržava 2 g glicerola

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; makrogoli; natrijev stearat

**Način izdavanja**

Glicerinski čepići dostupni su bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

**Izrađuje:** Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

**Galenski pripravak**

00610/1