



## KATALOG GALENSKIH PRIPRAVAKA

2023 /2024



[www.ljekarnasdz.hr](http://www.ljekarnasdz.hr)

SAMO ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE



	
<b>Sadržaj</b>	
<b>1. GALENSKI PRIPRAVCI</b>	
<b>1.1. KAPI I SPREJEVI ZA UHO, OČI, NOS</b>	<b>3</b>
1.1.1. KAPI I SPREJEVI ZA UHO	4
1.1.2. KAPI ZA OČI	4
1.1.3. KAPI I SPREJEVI ZA NOS	5
<b>1.2. TOPIKALNI PRIPRAVCI</b>	<b>7</b>
1.2.1. PRIPRAVCI ZA USNE I USNU ŠUPLJINU	8
1.2.2. PRIPRAVCI ZA KOŽNE IRITACIJE	10
1.2.3. PRIPRAVCI ZA PROBLEME S VENAMA	13
1.2.4. PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLI	14
1.2.5. PRIPRAVCI ZA HEMOROIDE	15
1.2.6. PRIPRAVCI ZA KURJE OČI	16
<b>1.3. SUPOZITORIJI I VAGITORIJI</b>	<b>20</b>
<b>1.4. ANALGETICI I ANTIPIRETICI</b>	<b>21</b>
<b>1.5. BILJNI PRIPRAVCI (PLANTEA)</b>	<b>23</b>
1.5.1. SIRUPI	24
1.5.2. BILJNE KAPI I TINKTURE	26
1.5.3. ČAJEVI	28
1.5.4. TOPIKALNI PRIPRAVCI	34
1.5.5. KAPSULE	36
<b>1.6. PRIPRAVCI ZA NJEGU LICA I TIJELA</b>	<b>37</b>
<b>1.7. OTOPINE</b>	<b>41</b>
<b>1.8. OSTALI PRIPRAVCI</b>	<b>43</b>
<b>2. GALENSKI PRIPRAVCI NA LISTI HZZO-A</b>	
<b>2.1. KAPI ZA OČI</b>	<b>46</b>
<b>2.2. KAPI ZA NOS</b>	<b>48</b>
<b>2.3. TOPIKALNI PRIPRAVCI</b>	<b>49</b>

# uvod **intro**

**Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije** je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu županije te ujedno najveća i najstarija ustanova u ljekarničkoj djelatnosti na području županije.

Ljekarnička djelatnost se obavlja u 37 ljekarni, 3 depoa lijekova, biljnoj specijaliziranoj prodavaonici, Galenskom laboratoriju te Laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari.

Galenski laboratorij Split je osnovan 1967. godine i u istome se, prema pravilima dobre prakse, izrađuju magistralni i galenski pripravci za ljekarne i druge zdravstvene ustanove. Izrada obuhvaća širok spektar pripravaka poput kapi za oko, uho ili nos, različitih otopina, polučvrstih i čvrstih pripravaka te čajeva.

Laboratorij za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari vrši analize i identifikacije sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda prema pravilima dobre prakse. Redovitom provjerom kakvoće pripravaka osigurava se njihova ispravnost, sigurnost i učinkovitost.



**1.1.**

## **KAPI I SPREJEVI ZA UHO, OČI I NOS**



## 1.1.1.

# Kapi i sprejevi za uho

## OTOSOL, kapi za uho, 10 mL

**Šifra:** 00271 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su fenazon i prokainklorid. Djeluju protupalno, analgetski i lokalno anestetski. Upotrebljavaju se za lokalno, simptomatsko liječenje boli u ušnom kanalu, kod vanjske upale uha (otitis externa), akutne upale srednjeg uha (otitis media) te za bolove u uhu različitih uzroka.

DOB (godine)	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
< 14	2-3 kapi	3-4 puta dnevno
> 14	5 kapi	3-4 puta dnevno



## OTOMAR, sprej za uho, 10 mL

**Šifra:** 03359 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su acetatna kiselina i izopropilni alkohol. Upotrebljava se za prevenciju ili dodatnu terapiju kod upale vanjskog uha. Zadržavanjem vode u ušnom kanalu stvara se vlažna i topla sredina koja pogoduje nastanku upala. Otomar sprej isušuje uho, optimizira pH vrijednost i tako sprječava nastanak upale.

Odrasli trebaju nakon kupanja, plivanja i ronjenja raspršiti 2 do 3 potiska spreja, a djeca starija od 3 godine 1 do 2 potiska spreja za uho u zvukovod.

## 1.1.2.

# Kapi za oči

## OFTASOL, kapi za oči, 10 mL

**Šifra:** 00034 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su boratna kiselina i natrijev tetraborat. Djeluju blago antiseptički i protiv gljivičnih i bakterijskih infekcija.

Upotrebljavaju se za razne iritacije oka, uključujući i konjunktivitis. Mogu se upotrebljavati kod svih dobnih skupina, uključujući i dojenčad.



## 1.1.3.

# Kapi i sprejevi za nos

## AQUASIN, sprej za nos, 20 mL

**Šifra:** 00253 | **Pakiranje:** 20 mL | **PDV:** 25%

Sadrži fiziološku otopinu s mentolom i eukaliptusovim eteričnim uljem koji svojim antibakterijskim djelovanjem ublažavaju upalne procese i smanjuju otok nosne sluznice.

Preporučuje se kod začepljenog nosa, prehlade, upale sinusa, hunjavice i alergije. Primjenjuje se 2 – 5 puta dnevno po 1 – 2 potiska spreja u svaku nosnicu. Može se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 4 godine.



## FIZIOLOŠKA OTOPINA, sprej za nos, 20 mL

**Šifra:** 00576 | **Pakiranje:** 20 mL | **PDV:** 25%

Fiziološka otopina vlaži i čisti sluznicu nosa te održava normalnu prohodnost gornjih dišnih putova.

Zbog svog izotoničnog sastava i fiziološke pH vrijednosti ne remeti normalnu funkciju nosa, stoga se može upotrebljavati kod novorođenčadi, djece, trudnica, dojilja i starijih osoba.



## ZOLIN 0,05% + dekspantenol, sprej za nos, 10 mL

## ZOLIN 0,1% + dekspantenol, sprej za nos, 10 mL

**Zolin 0,05% + Dekspantenol**  
**Zolin 0,1% + Dekspantenol**

**Šifra:** 02421  
**Šifra:** 02192

**Pakiranje:** 10 mL  
**Pakiranje:** 10 mL

**PDV:** 25%  
**PDV:** 25%

Djelatne tvari u Zolin spreju za nos su ksilometazolin hidroklorid i dekspantenol. Ksilometazolin hidroklorid izaziva stezanje krvnih žilica u sluznici nosa i tako smanjuje otečenost sluznice. Dekspantenol je derivat pantotenske kiseline koja potiče zacjeljivanje i štiti sluznicu nosa.

Upotrebljavaju se za simptomatsko smanjenje začepljenosti nosa kod upale sluznice nosa (rinitisa), upale sinusa (sinusitisa) te kod kataralne upale srednjeg uha povezane s hunjavicom.

DOB (godine)	SPREJ ZA NOS	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
2- 6	0,05 %	1 potisak	3 puta dnevno
> 6	0,1 %	1 potisak	3 puta dnevno

1.1.3.

# Kapi i sprejevi za nos

## HIPERTONIČNA OTOPINA, sprej za nos, 20 mL i 50 mL

Šifra: 02985 | Pakiranje: 20 mL | PDV: 25%  
 Šifra: 03017 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%

Sastav hipertonične otopine odgovara 2,3 postotnoj otopini natrijevog klorida. Uklanja višak tekućine iz sluznice nosa po principu osmotskog gradijenta. Olakšava smetnje kod začepljenosti nosa, čisti i vlaži sluznicu nosa, omekšava i uklanja nakupljeni mukozni sekret te pomaže u prevenciji kronične upale sluznice nosa (rinosinusitis).

Mogu je upotrebljavati novorođenčad, djeca, trudnice, dojilje i starije osobe.



## VISKOMAR, sprej za nos, 10 mL

Šifra: 02695 | Pakiranje: 10 mL | PDV: 25%

Sadrži viskoznu fiziološku otopinu koja vlaži i čisti sluznicu nosa te održava normalnu prohodnost gornjih dišnih putova.

Zbog svog izotoničnog sastava i fiziološke pH vrijednosti ne remeti normalnu funkciju nosa, stoga se može upotrebljavati kod novorođenčadi, djece, trudnica, dojilja i starijih osoba.

## NAZOSOL 0,05% i 0,1%, kapi za nos, 10 mL

## NAZOSOL 0,1%, sprej za nos, 10 mL

Nazosol 0,05 % kapi za nos  
 Nazosol 0,1 % kapi za nos  
 Nazosol 0,1 % sprej za nos

Šifra: 00275 | Pakiranje: 10 mL | PDV: 25%  
 Šifra: 00276 | Pakiranje: 10 mL | PDV: 25%  
 Šifra: 02699 | Pakiranje: 10 mL | PDV: 25%

Djelatna tvar je nafazolinklorid koji izaziva stezanje krvnih žilica u sluznici nosa i tako smanjuje otečenost sluznice. Rezultat je smanjena začepljenost nosa, olakšano istjecanje sekreta i nesmetano disanje.

Upotrebljavaju se za simptomatsko smanjenje začepljenosti nosa kod upale sluznice nosa (rinitisa), hunjavice, curenja iz nosa, upale sinusa (sinusitisa) te pri kataru cijevi srednjeg uha povezanog s hunjavicom.



DOB (godine)	KAPI ILI SPREJ ZA NOS	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
6 - 12	0,05 %	1-2 kapi	3-4 puta dnevno
> 12	0,1 %	2-3 kapi / 1 potisak	3-4 puta dnevno



1.2.

# TOPIKALNI PRIPRAVCI

## 1.2.1.

# Pripravci za usne i usnu šupljinu



## MAST ZA HERPES, 6 g

**Šifra:** 00056 | **Pakiranje:** 6 g | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su lidokain, cinkov oksid, eterično ulje australijskog čajevca i sumpor za vanjsku upotrebu. Upotrebljava se kod infekcije herpes simplex virusom za lokalnu primjenu na koži, najčešće na usnicama te oko usta i nosa. Cinkov oksid u dodiru sa sekretima sluznice stvara cinkate koji stežu oboljelo tkivo, lidokain djeluje dugotrajno anestetski, eterično ulje australijskog čajevca djeluje antivirusno, antibakterijski i antimikotski na područje herpesa, a sumpor djeluje blago antiseptički i keratolitički.

Primjenjuje se na oboljelo područje do 5 puta dnevno i do 7 dana.

## KAPI PROTIV ZUBOBOLJE, 10 mL

**Šifra:** 00035 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su benzokain, kliničevo eterično ulje, kamfor i tinktura uspravne petoprste. Benzokain djeluje anestetski, kliničevo eterično ulje sadrži eugenol koji djeluje analgetski, anestetski, antibakterijski i protuupalno, kamfor poboljšava prokrvljenost i dovodi do ugodnog osjećaja topline i tinktura uspravne petoprste sadrži tanine koji djeluju adstringentno.

Upotrebljavaju se za ublažavanje upale zubi i okolnog tkiva te za ublažavanje boli kod različitih tegoba (pulpitis, periodontitis).

Primjenjuju se uz pomoć vate tako da se nakapa 5 – 10 kapi i nanese na bolno područje do 4 puta dnevno. Mogu se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 2 godine.



## GEL ZA DESNI, 10 g

**Šifra:** 03035 | **Pakiranje:** 10 g | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su lidokain, natrijev hijaluronat i ekstrakt kamilice. Lidokain djeluje anestetski, natrijev hijaluronat omogućava brže zacjeljivanje sluznice i ekstrakt kamilice dokazano djeluje antibakterijski i protuupalno.

Upotrebljava se za ublažavanje boli prilikom nicanja zubi, kod blagih upala ili oticanja desni, kod angularnog heilitisa (tzv. žvale), kod iritacija sluznice uzrokovanih protezama ili dentalnim aparatićima i kod afti. Primjenjuje se do 3 puta dnevno nanošenjem na zahvaćena područja.



## ORALGAL, umjetna slina, 30 doza

**Šifra:** 02547 | **Pakiranje:** 30 doza | **PDV:** 25%

Oralgal pripravak sastoji se od 2 odvojeno pakirane otopine: Oralgal A, vodena otopina natrijevog fosfata i natrijevog klorida i Oralgal B, vodena otopina kalcijevog i natrijevog klorida. Mješavina Oralgal A i Oralgal B u jednakim omjerima daje umjetnu slinu, prezasićenu otopinu elektrolita za vlaženje, podmazivanje i čišćenje usne šupljine.

Upotrebljava se za liječenje suhoće usta i grla kod hiposalivacije i kserostomije te kao prevencija ili liječenje oralnog mukozitisa.

Primjena se vrši miješanjem jedne boćice Oralgal A i jedne boćice Oralgal B u čistoj čaši i tako se usna šupljina ispira 4 – 10 puta dnevno.



## AFTAGAL, sprej za afte i grlo, 30 mL

**Šifra:** 02020 | **Pakiranje:** 30 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su lidokainklorid, eterično ulje australijskog čajevca i dekspantenol. Lidokainklorid reverzibilno blokira periferne živce i tako smanjuje osjet boli, eterično ulje australijskog čajevca djeluje antivirusno, antibakterijski i antimikotski, a dekspantenol spispješuje proces cijeljenja ranica te štiti i smiruje upalne promjene na koži.

Upotrebljava se kod infekcija usne šupljine (faringitis, laringitis), upale desni i sluznice usta (afte, gingivitis, stomatitis) te kod otežanog gutanja. Primjenjuje se 3 – 10 puta dnevno, ovisno o dobi, a može se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 3 godine.



1.2.2.

## Pripravci za kožne iritacije

# koža



### GEL S ČAJEVCEM, 50 g

**Šifra:** 03033 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Djelatna tvar je eterično ulje australijskog čajevca koje dokazano djeluje antibakterijski, antimikotski, antivirusno i protuupalno.

Upotrebljava se kod problema s blagim do umjerenim aknama, ljuštenja kože stopala čiji je uzročnik gljivica *Tinea pedis*, tzv. atletsko stopalo te onihomikoza.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na oboljelo područje, a može se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 10 godina.



### PLANTAGEL, gel, 50 g

**Šifra:** 00153 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Plantagel je emulzijski gel koji sadrži ekstrakte kamilice i nevena. Kamilica pospješuje zacjeljivanje rana i smiruje iritaciju kože, dok neven zahvaljujući visokom udjelu flavonoida djeluje protuupalno i ubrzava stvaranje novih stanica.

Plantagel se upotrebljava za umirenje kožnih reakcija različitih uzroka: oštećene i irritirane kože, osipa, ranica, sunčanih i drugih opeketina, opeketina meduza, uboda i ugriza insekata, nakon depilacije i brijanja te kod osipa uslijed znojenja.

Upotrebljava se kod odraslih i djece starije od 6 mjeseci, a može se primjenjivati 2 – 6 puta dnevno.



### RIBLJA MAST, 30 g

**Šifra:** 00051 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Riblja mast sadrži riblje ulje koje se dobiva iz jetre različitih vrsta bakalara *Gadus sp.* Sadrži 85% glicerida nezasićenih masnih kiselina, najviše omega-3, te vitamine A i D koji su neophodni za pravilan razvoj kože te pospješuju obnavljanje i cijeljenje blažih kožnih oštećenja.

Riblja mast se upotrebljava kod sunčanih i drugih opeketina, kod rana uzrokovanih ležanjem (dekubitus), fisura, ragada, pelenskog osipa te kod iritacija i ozljeda, posebno na pregibima, izazvanih trenjem ili prekomjernim znojenjem. Primjenjuje se 3 – 4 puta dnevno na zahvaćeno područje kože.



### IHTAMOL MAST, 30 g

**Šifra:** 00254 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Djelatna tvar je ihtamol, odnosno amonijev sulfogirodalat. Djeluje protuupalno, antiseptički, antibakterijski i antimikotski. Upotrebljava se kod atopijskog dermatitisa (neurodermitisa), kroničnog lihenifikacijskog dermatitisa i ostalih vrsta ekcema tj. dermatitisa koje karakterizira zadebljana, suha i ljuškava koža popraćena svrbežom. Također se upotrebljava kod akni, folikulitisa, venskih ulkusa i drugih upalnih promjena kože. Poznata i pod nazivima: Crna mast, Ihtiol mast ili Mast amonijevog sulfogirodalata.

Primjenjuje se 1 – 3 puta dnevno na oboljelo područje.



### UROTROPIN GEL, 30 g

**Šifra:** 00052 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Djelatna tvar je metenamin koji uravnovežuje pretjeranu aktivnost žlijezda znojnica. Djelovanjem kiselina iz znoja se razgrađuje na formaldehid koji umanjuje djelovanje žlijezda znojnica.

Upotrebljava se za sprječavanje prekomjernog znojenja stopala, dlanova i pazuha. Primjenjuje se navečer na čiste i suhe dijelove tijela koji se pretjerano znoje (stopala, dlanovi, pazušje), do 7 dana, a primjena se može ponoviti nakon pauze od 20 dana.



### BORVAZELIN MAST, 25 g

**Šifra:** 00032 | **Pakiranje:** 25 g | **PDV:** 25%

Djelatna tvar je boratna kiselina koja ima antiseptički i antifungalni učinak. Upotrebljava se za liječenje različitih iritacija na koži, manjih posjekotina i ogrebotina te uboda insekata.

Primjenjuje se 1 – 3 puta dnevno, a može se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 2 godine.



### CINKOVA PASTA, 30 g

**Šifra:** 03198 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Sadrži cinkov oksid koji ima blago stežuće, zaštitno i antiseptičko djelovanje. Upotrebljava se kao zaštitni premaz kod blagih kožnih iritacija, ispucale kože te za zaštitu kože kod pelenskog osipa. Cinkov oksid u kontaktu s upalnim sekretima kože formira cinkate koji stežu oboljelo tkivo i isušuju sekret.

Primjenjuje se na oboljelo područje 1 – 3 puta dnevno.



### MAST ZA OZEBLINE, 30 g

**Šifra:** 03277 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su ihtamol, tanini, kamfor i eterično ulje eukaliptusa. Ihtamol ima antiseptičko i protuupalno djelovanje, tanini stežu tkivo te smanjuju upalu te kamfor i eterično ulje eukaliptusa djeluju na bolju prokrvljenost. Sadrži i peruanski balzam i ricinusovo ulje koji pospješuju obnavljanje kože.

Primjenjuje se 3 puta dnevno na područja kože zahvaćena ozeblinama.

1.2.2.

## Pripravci za kožne iritacije

# koža



### DIFENGAL, krema, 30 g

### DIFENGAL, sprej, 100 mL

Difengal, krema  
Difengal, sprej

Šifra: 03347  
Šifra: 03254

Pakiranje: 30 g  
Pakiranje: 100 mL

PDV: 25%  
PDV: 25%

Djelatna tvar je difenhidraminklorid, antihistaminik.

Upotrebljava se za ublažavanje simptoma svrbeža i iritacija povezanih s osipom, koprivnjačom (urtikarijom), blagim opeketinama od sunca te ugrizom i ubodom insekata.

Difengal krema se primjenjuje na zahvaćeno područje kože 2 – 3 puta dnevno, a Difengal sprej se primjenjuje na zahvaćeno područje kože 3 – 4 puta dnevno.

Upotrebljavaju se kod odraslih i djece starije od 2 godine.



### NEVENOVA MAST, 100 mL

Šifra: 03231 | Pakiranje: 100 mL | PDV: 25%

Sadrži tekući ekstrakt nevenovog cvijeta i djevičansko maslinovo ulje. Pomaže kod blažih oboljenja i oštećenja kože: ogrebotina, ranica, dekubitus, zatvorenih opeketina, suhih ekcema, uboda i ugriza insekata, sunčanih opeketina.

Primjenjuje se 3 – 4 puta dnevno u tankom sloju na zahvaćeno mjesto kože. Nevenova mast ne sadrži konzervante, boje, ni mirise.



### Dermatol prašak, 8 g

Šifra: 00438 | Pakiranje: 8 g | PDV: 25%

Djelatna tvar je bizmutov subgalat: adstringens, protektiv i antisептик. Potiče granulaciju i zarastanje rana. Mogu ga upotrebljavati odrasli, djeca i dojenčad.

### TEKUĆI PUDEZ za osip, 150 g

Šifra: 00470 | Pakiranje: 150 g | PDV: 25%

Sastav je cinkov oksid, talk, glicerol, kalcijev glukonat, kalijev sorbat i pročišćena voda.

### TEKUĆI PUDEZ sa anestezinom 5%, 150 g

Šifra: 00471 | Pakiranje: 150 g | PDV: 25%

Sastav je benzokain, mentol, cinkov oksid, talk, glicerol, razrijedjeni alkohol i pročišćena voda.



1.2.3.

## Pripravci za probleme s venama

# vene

### HEPAGAL 1000 + Gavez gel 50 g

### HEPAGAL 500 + Gavez gel 100 g

Hepagal 1000 + gavez gel  
Hepagal 500 + gavez gel

Šifra: 02307  
Šifra: 03257

Pakiranje: 50 g  
Pakiranje: 100 g

PDV: 25%  
PDV: 25%

Djelatne tvari su heparin, koji sprječava pojavu krvnih ugrušaka u površinskim venama, poboljšava lokalnu cirkulaciju i smanjuje oticanje, te gavez, koji djeluje protuupalno, analgetski i smanjuje oticanje tkiva.



Upotrebljava se za liječenje bolesti, sprječavanje komplikacija i olakšavanje simptoma kod problema s površinskim venama, oteklinama, modricama i bolovima kod uganuća, iščašenja, nagnjećenja i podljeva te kod upale zglobova i mišića.

Mogu ga upotrebljavati odrasli i djeca starija od 1 godine, a primjenjuje se 2 – 4 puta dnevno.

1.2.4.

## Pripravci za liječenje boli

### DIKLOFENAK PLUS GEL, 50 g i 100 g

Pakiranje: 50 g | PDV: 25%  
 Pakiranje: 100 g | PDV: 25%



Djelatne tvari su diklofenaknatrij, iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) te levomentol, koji hlađi i ublažava bol.

Upotrebljava se za liječenje akutne boli, smanjivanje upale i oticanja kod bolnih stanja koja zahvaćaju mišiće i zglobove te simptomatsko liječenje kod ozljeda mekih tkiva, kao što su posttraumatske upale tetiva, ligamenata, mišića i zglobova.

Mogu ga upotrebljavati odrasli i djeca starija od 14 godina, a primjenjuje se 2 puta dnevno nanošenjem na područje tijela zahvaćeno bolovima.

### TERMOKREMA, 40 g

Šifra: 02770 | Pakiranje: 40 g | PDV: 25%



Djelatne tvari su metilsalicilat, koji ima nadražujući i protuupalni učinak, levomentol, koji djeluje lokalno anestetski i analgetski uz produženi osjećaj hladnoće te paprikina uljna smola, koja izaziva žarenje i ima analgetski učinak.

Upotrebljava se kod boli u mišićima i ukočenosti u ledima, reumatske boli, fibrozitisa (fibromialgije), lumbaga (križobolje tj. boli u donjem dijelu leđa) i išijasa.

Upotrebljava se kod odraslih i djece starije od 12 godina, a primjenjuje se 2 – 3 puta dnevno na područje tijela zahvaćeno bolovima.

### LIDOKAIN 2% gel, 25 g

Šifra: 02661 | Pakiranje: 25 g | PDV: 25%



Djelatna tvar je lidokainklorid, lokalni anestetik iz grupe amidnih spojeva.

Upotrebljava se za lokalnu anesteziju kod kateterizacije uretre, cistoskopije i endoskopije probavnog sustava. Počinje djelovati nakon 5 – 10 minuta od primjene, a ne preporučuje se upotreba kod djece mlađe od 2 godine. Kod djece i adolescenata treba smanjiti dozu na maksimalno 3 mg/kg tjelesne težine.

### GAVEZOVA MAST, 50 mL

Šifra: 02406 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%



Gavezova mast sadrži tinkturu korijena gaveza, koji djeluje protuupalno i analgetski te nevenovo ulje, koje doprinosi protuupalnom učinku pripravka. Gavezova mast se upotrebljava kod sportskih ozljeda, uganuća, iščašenja, podlijeva, osteoartritisa, boli u ledima, upale mišića i zglobova.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na područje tijela zahvaćeno bolovima, do 14 dana, a može se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 3 godine.

1.2.5.

## Pripravci za hemoroide



### ČEPIĆI ZA HEMOROIDE, 10 kom

Šifra: 00270 | Pakiranje: 10 kom | PDV: 25%

Djelatne tvari su lidokain, lokalni anestetik, bizmutov subgalat i cinkov oksid, koji pomažu sušenju ranica i smanjuju otok sluznice, peruański balzam, antiseptik, a eterično ulje čempresa djeluje kao venotonik. Upotrebljavaju se u terapiji vanjskih i unutarnjih hemoroidea, kod ekcema anusa i svrbeža u analnom području. Primjenjuju se 2 – 3 puta dnevno na način da se 1 čepić uvede u debelo crijevo.

### MAST ZA HEMOROIDE, 30 g

Šifra: 00146 | Pakiranje: 30 g | PDV: 25%

Djelatne tvari su lidokain, bizmutov subgalat, cinkov oksid, peruański balzam, ekstrakt kamilice, ulje gospine trave i eterično ulje čempresa. Lidokain djeluje anestetski, bizmutov subgalat i cinkov oksid pomažu sušenju ranica i smanjuju otok sluznice, peruański balzam djeluje antiseptički, ekstrakt kamilice i ulje gospine trave djeluju protuupalno i pospješuju zacjeljivanje ranica te eterično ulje čempresa djeluje kao venotonik.

Upotrebljava se u terapiji vanjskih i unutarnjih hemoroidea, kod ekcema anusa i svrbeža u analnom području. Primjenjuje se 2 – 3 puta dnevno lokalno na hemoroidalne promjene na koži.

Upotrebljava se kod odraslih i djece starije od 12 godina.

1.2.6.

## Pripravci za kurje oči



### FLASTER ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU, 3 kom

Šifra: 00039 | Pakiranje: 3 kom | PDV: 25%

Djelatne tvari su salicilatna kiselina, koja omekšava jako orogeni sloj kože, i laktatna kiselina, koja upotpunjuje keratolitičko djelovanje salicilatne kiseline i pomaže uklanjanju virusa.

Upotrebljava za liječenje kurjih očiju. Nakon namakanja zahvaćenog područja kože u mlakoj vodi barem 10 minuta, flaster se zalijepi na kurje oko te se ostavi da djeluje 3 dana, nakon čega se odlijepi, a kurje oko odstrani struganjem.

Može se upotrebljavati kod djece 2 – 12 godina pod liječničkim nadzorom te kod adolescenata i odraslih osoba.

### OTOPINA ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU, 10 mL

Šifra: 00049 | Pakiranje: 10 mL | PDV: 25%

Djelatne tvari su salicilatna kiselina, koja omekšava jako orogeni sloj kože, i laktatna kiselina, koja upotpunjuje keratolitičko djelovanje salicilatne kiseline i pomaže uklanjanju virusa.

Upotrebljava za liječenje kurjih očiju, kožnih kalusa, bradavica i veruka.

Primjenjuje se jednom navečer pomoću četkice na zatvaraču, nakon namakanja oboljelog područja u mlakoj vodi barem 10 minuta.

Može se upotrebljavati kod djece 2 – 12 godina pod liječničkim nadzorom te kod adolescenata i odraslih osoba.

### MAST ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU, 10 g

Šifra: 00038 | Pakiranje: 10 g | PDV: 25%

Djelatna tvar je salicilatna kiselina koja omekšava jako orogeni sloj kože čime se olakšava odstranjanje.

Upotrebljava za liječenje kurjih očiju, kožnih kalusa, bradavica i veruka.

Primjenjuje se jednom navečer, nakon namakanja oboljelog područja u mlakoj vodi barem 10 minuta.

Može se upotrebljavati kod djece 2 – 12 godina pod liječničkim nadzorom, te kod adolescenata i odraslih osoba.



1.3.

## ČEPIĆI I VAGITORIJI

1.3.1.

# Čepići i vagitoriji

## IBUPROFEN čepići 60 mg i 125 mg, 10 kom

Ibuprofen čepići 60 mg	Šifra: 03276	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%
Ibuprofen čepići 125 mg	Šifra: 03280	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%

Djelatna tvar je ibuprofen, lijek iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova. Upotrebljavaju se za snižavanje povišene tjelesne temperature i ublažavanje blagih do umjerenih bolova.

Ibuprofen 60 mg čepići su namijenjeni za liječenje djece tjelesne mase 6-12 kg (približne dobi od 3 mjeseca do 2 godine). Ibuprofen 125 mg čepići su namijenjeni za liječenje djece tjelesne mase između 12,5 i 20,5 kg (približne dobi od 2 do 6 godina).



## BRONHOPULMIN čepići, 10 kom

Šifra: 02264	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%
--------------	-------------------	----------

Djelatna tvar je eterično ulje klekovine koje djeluje antiseptički i protuupalno. Upotrebljavaju se kod kašlja, prehlade, akutnog i kroničnog bronhitisa i drugih upala dišnih putova. Pomaže u izlučivanju gусте bronhijalne sluzi, olakšavaju iskašljavanje i ublažavaju neproduktivni (suhii) kašalj.

Mogu se upotrebljavati kod djece starije od 30 mjeseci (2,5 godine), primjenjuju se 2 čepića dnevno, najduže 3 dana.



## ČEPIĆI ZA HEMOROIDE, 10 kom

Šifra: 00270	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%
--------------	-------------------	----------

Djelatne tvari su lidokain, lokalni anestetik, bizmutov subgalat i cinkov oksid, koji pomažu sušenju ranica i smanjuju otok sluznice, peruanски balzam, antiseptik, te eterično ulje čempresa, koje djeluje kao venotonik.

Upotrebljavaju se u terapiji vanjskih i unutarnjih hemoroida, kod ekcema anusa i svrbeža u analnom području.

Primjenjuju se 2 – 3 puta dnevno na način da se 1 čepić uvede u debelo crijevo.



## GLICERINSKI čepići za djecu, 10 kom

## GLICERINSKI čepići za odrasle, 10 kom

Glicerinski čepići za djecu	Šifra: 00047	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%
Glicerinski čepići za odrasle	Šifra: 00048	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%

Djelatna tvar je glicerol, lokalni laksativ koji povećava sadržaj vode u stolici čime je omekšava i olakšava pražnjenje crijeva te nadražuje sluznicu rektuma čime potiče peristaltiku.

Upotrebljavaju se kod akutnog zatvora, za čišćenje crijeva prije operacija i radioloških pretraga, a mogu se upotrebljavati kod svih dobnih skupina.

DOB (godine)	UKUPNA DNEVNA DOZA
0 - 6	1 glicerinski čepić za djecu
6 - 12	1 glicerinski čepić za odrasle
> 12	1 - 2 glicerinska čepića za odrasle



## ČEPIĆI PROTIV MUČNINE, 10 kom

Šifra: 02680	Pakiranje: 10 kom	PDV: 25%
--------------	-------------------	----------

Djelatna tvar je dimenhidrinat, antihistaminik koji djeluje na središnji živčani sustav i unutarnje uho te pomaže prevenirati probleme ravnoteže i blokirati procese koji su uključeni u refleks povraćanja. Upotrebljavaju se za prevenciju i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice različitih uzroka.

Kod bolesti putovanja primijeniti 30 minuta do 1 sat prije putovanja.

Mogu se upotrebljavati kod odraslih i djece starije od 2 godine.

DOB (godine)	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
2 - 6	½ - 1	1 put dnevno
6 - 8	½ - 1	Svakih 8 - 12 sati
8 - 12	1-2	Svakih 8 - 12 sati
> 12	2	Svakih 8 - 12 sati



1.3.1.

## Čepići i vagitoriji



### VAGINAL, vagitoriji, 10 kom

Šifra: 02323 | Pakiranje: 10 kom | PDV: 25%

Djelatne tvari su eterično ulje australijskog čajevca, klinčićeve eterično ulje i ulje gospine trave koji zajedno djeluju dokazano protuupalno. Upotrebljavaju se za terapiju upale rodnice različitih uzroka i upale vrata maternice.

Primjenjuje se 1 vagitorij svaku večer tijekom 10 dana.



1.4.

## ANALGETICI I ANTIPIREТИCI

1.4.1.

## Analgetici i antipiretici



### PARACETAMOL sirup 120 mg/5 mL, 100 mL

Šifra: 00072 | Pakiranje: 100 mL | PDV: 25%

Paracetamol 120 mg/5 mL sirup sadrži djelatnu tvar paracetamol koji pomaže pri snižavanju povišene temperature (antipiretik) i smanjenju bolova (analgetik).

Namijenjen je djeci u dobi od 2 mjeseca do 12 godina.

### IBUPROFEN čepići 60 g i 125 g, 10 kom

Ibuprofen čepići 60 g | Šifra: 03276 | Pakiranje: 10 kom | PDV: 25%  
Ibuprofen čepići 125 g | Šifra: 03280 | Pakiranje: 10 kom | PDV: 25%

Djelatna tvar je ibuprofen, lijek iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova. Upotrebljavaju se za snižavanje povišene tjelesne temperature i ublažavanje blagih do umjerenih bolova.

Ibuprofen 60 mg čepići su namijenjeni za liječenje djece tjelesne mase 6-12 kg (pričvršćene dobi od 3 mjeseca do 2 godine). Ibuprofen 125 mg čepići su namijenjeni za liječenje djece tjelesne mase između 12,5 i 20,5 kg (pričvršćene dobi od 2 do 6 godina).



1.5.

## BILJNI PRIPRAVCI PLANTEA

1.5.1.

# Sirupi



## SIRUP BIJELOG SLJEZA, 200 mL

**Šifra:** 00279 | **Pakiranje:** 200 mL | **PDV:** 25%

Sadrži suhi ekstrakt korijena bijelog sljeza. Upotrebljava se kod upale sluznice gornjih dišnih putova i djeluje umirujuće na suhi, nadražajni kašalj. Eterična ulja anisa i komorača djeluju povoljno na bronhije pluća te smiruju napadajući kašlj. Upotrebljava se i za ublažavanje simptoma promuklosti i katara glasnica.

Mogu ga upotrebljavati djeca starija od 1 godine, adolescenti, odrasli i trudnice.

## SIRUP ISLANDSKOG LIŠAJA, 200 mL

**Šifra:** 00349 | **Pakiranje:** 200 mL | **PDV:** 25%

Sadrži suhi ekstrakt steljke islandskog lišaja. Upotrebljava se kod upale i nadraženosti sluznice usta i ždrijela, uključujući promuklost i grlobolju te kod suhog, nadražajnog kašlja. U svom sastavu ima lihenske kiseline (gorke tvari) koje djeluju antimikrobično.

Mogu ga upotrebljavati djeca starija od 1 godine, adolescenti, odrasli i trudnice.

## SIRUP TRPUTAC, 200 mL

**Šifra:** 01891 | **Pakiranje:** 200 mL | **PDV:** 25%

Sadrži suhi ekstrakt trpučevog lista, standardiziran na sadržaj akteozida. Trputac je bogat sluzima koje oblažu sluznicu dišnih putova, tvoreći zaštitni sloj koji smanjuje podražaj na kašlj. Pomaže u izlučivanju prekomjerne sluzi, kod promuklosti, katara glasnica, bronhitisa i ostalih upala dišnih putova.

Mogu ga upotrebljavati djeca starija od 3 godine, adolescenti i odrasli.

## SIRUP LISTA BRŠLJANA, 150 mL

**Šifra:** 00488 | **Pakiranje:** 150 mL | **PDV:** 25%

U svom sastavu sadrži suhi ekstrakt lista bršljana. Upotrebljava se kao ekspektorans kod produktivnog kašlja. Aktivni sastojci sirupa razrjeđuju gustu bronhijalnu sluz te opuštaju glatke mišiće dišnih putova dovodeći do olakšanog disanja.

Mogu ga upotrebljavati djeca starija od 2 godine, adolescenti, odrasli i dijabetičari.

NE SADRŽI ŠEĆER!

## EHIGAL SIRUP, 200 mL

**Šifra:** 02531 | **Pakiranje:** 200 mL | **PDV:** 25%

Sadrži tekuće ekstrakte zeleni purpurne rudbekije (Echinacea), korijena bijelog sljeza i mineral cink.

Upotrebljava se za poboljšanje fizičke otpornosti pri osjetljivosti na prehladu i kod ponavljajućih infekcija, a zbog ekstrakta korijena bijelog sljeza oblaže sluznicu grla i ždrijela, umiruje podražaj na kašlj te pomaže kod promuklosti i katara glasnica.

Mogu ga upotrebljavati djeca starija od 4 godine, adolescenti i odrasli.

NE  
sadrži  
šećer



1.5.2.

## Biljne kapi i tinkture

### KOLESAN biljne kapi, 50 mL

Šifra: 00062 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%

Kolesan kapi su smjesa tinktura ljekovitih biljaka kamilice, pelina i metvice. Kamilica pomaže kod blagih gastrointestinalnih problema (grčevi, nadutost), pelin potiče apetit, pospješuje probavu, potiče lučenje žuči i povoljno djeluje kod blagih dispeptičnih tegoba te metvica koja pomaže kod akutnog i kroničnog gastritisa, grčeva u probavnog traktu, nadutosti te pospješuje izlučivanje žuči.

Upotrebljavaju se kod akutnog i kroničnog gastritisa, nadimanja, podrigivanja i grčeva kod otežanog probavljanja hrane. Primjenjuju se 1 – 3 puta dnevno po 20 kapi. Mogu ih upotrebljavati odrasli i djeca starija od 18 godina.



### VALISAN biljne kapi, 50 mL

Šifra: 00067 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%

Valisan kapi su smjesa tinktura ljekovitih biljaka: gloga, koji se upotrebljava za uklanjanje problema sa srcem (nepravilan, ubrzan rad) te kod blagih simptoma stresa i nesanice i odoljena, koji pomaže kod nesanice, razdražljivosti i uznemirenosti te opušta mišiće probavnog trakta i tako ublažava nadutost, bolove u želudcu i nagon za povraćanjem.

Upotrebljavaju kod anksioznih stanja popraćenih nesanicom te kod nepravilnog i ubrzanog rada srca. Primjenjuju se 1 – 3 puta dnevno po 20 kapi. Mogu ih upotrebljavati odrasli i djeca starija od 12 godina.

1.5.2.

## tinkture

### TINKTURA LISTA KOPRIVE, 50 mL

Šifra: 02240 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%

Upotrebljava se kod upale mokraćnih putova i kod pijeska u bubregu za prevenciju i liječenje. Oralno se primjenjuje 3 puta dnevno po 20 kapi.



### TINKTURA VRBOVICE, 50 mL

Šifra: 02239 | Pakiranje: 50 mL | PDV: 25%

Ima protuupalno djelovanje. Oralno se primjenjuje 3 puta dnevno po 20 kapi.



1.5.3.

# Čajevi

## ČAJ KAMILICA CVIJET, 40 g

**Šifra:** 00097 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu cvijeta kamilice čiji su glavni sastojci eterično ulje (bisabolol), flavonoidi i seskviterpensi laktoni. Upotrebljava se za ublažavanje blagih gastrointestinalnih tegoba (grčevi, nadutost, flatulencija), djeluje blago sedativno, a zbog svog protuupalnog, antibakterijskog i fungistatskog djelovanja se upotrebljava i za ispiranje i cijeljenje rana, naročito kod čireva i hemoroida.

Ne preporučuje se upotreba čaja kod dojenčadi mlađe od 6 mjeseci.



## ČAJ PRESLICA BILJKA, 40 g

**Šifra:** 00348 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Čaj od preslice ima diuretsko djelovanje zbog čega je djelotvoran kod bolesti bubrega i mokraćnog mjehura. Uzimanjem čaja od preslice ispiru se mokraćni putevi kod bakterijske upale i pijeska u bubrežima.

Preporučuje se i za smanjenje edema poslije traume te edema nakon dugotrajnog stajanja. Čaj se upotrebljava između 2 i 4 tjedna. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ ZELENI, 40 g

**Šifra:** 00339 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu lista zelenog čaja čiji su glavni sastojci galoikatehini, metilksantini (kofein) i tanini.

Upotrebljava se prvenstveno kao stimulans kod umora i osjećaja slabosti. Intenzivno se istražuje i njegov učinak u smanjenju prekomjerne tjelesne težine. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ SENA LIST, 40 g

**Šifra:** 00093 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sastoji od osušenih listova sene. Sena ima laksativno djelovanje i služi za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije. Upotrebljava se i za čišćenje crijeva prije rendgenskih pretraga te prije i poslije kirurških zahvata u predjelu trbuha. Primjenjuje se 1 žličica čaja 1 put dnevno, do 3 puta tjedno, a početak djelovanja nastupa nakon 8-12 sati. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ SLJEZOV, 50 g

**Šifra:** 00099 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Sadrži droge lista bijelog sljeza, korijena bijelog sljeza, cvijeta crnog sljeza, zeleni majčine dušice i anišev plod.

Upotrebljava se kod nadražene sluznice usta i ždrijela, upale grla (faringitis) te kod nadražajnog suhog kašlja. Aniš i majčina dušica pomažu kod produktivnog kašlja, omogućuju iskašljavanje te djeluju antimikrobnog. Preporučuje se upotreba i kod nadražaja na kašalj kod pušača.



## ČAJ BRUSNICA LIST, 40 g

**Šifra:** 00351 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Najviše se upotrebljava za prevenciju upala mokraćnih putova. Koristan je pri kroničnim urinarnim infekcijama, naročito onima uzrokovanim bakterijom *E. coli*. Učinkovit je i u prevenciji gastritisa uzrokovanih bakterijom *H.Pylori*.

## ČAJ SLJEZOV KORIJEN, 50 g

**Šifra:** 00098 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu korijena sljeza čiji su glavni sastojci sluzi, pektini i flavonoidi.

Upotrebljava se kod nadražene sluznice usta i ždrijela te kod nadražajnog suhog kašlja (antitusik). Zbog visokog sadržaja sluzi upotrebljava se za zaštitu sluznice želudca i crijeva, a u obliku obloga se može upotrebljavati za smirivanje upalnih stanja kože (ekcem, dermatitis).

1.5.3.

# Čajevi



## ČAJ HRASTOVA KORA, 80 g

**Šifra:** 00122 | **Pakiranje:** 80 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu hrastove kore čiji su glavni sastojci tanini, flavonoidi i proantocijanidi. Upotrebljava se u obliku čaja kod blagih proljeva te u obliku dekokta za ispiranje ili grljivanje kod upala usne šupljine i ždrijela. Kupka ili oblozi hrastove kore se mogu upotrebljavati kod upalnih stanja kože ili sluznica, kod žarenja i svrbeža uzrokovanih hemoroidima, kod znojenja nogu i kod ozeblina. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 18 godina.

## ČAJ METVICA LIST, 40 g

**Šifra:** 00115 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu lista metvice čiji su glavni sastojci eterično ulje (mentol), tanini i flavonoidi. Djeluje kao spazmolitik pa se upotrebljava kod tegoba popraćenih s grčevima. Osim što opušta probavu, potiče i lučenje žući te olakšava razgradnju masne hrane. Također se upotrebljava kod gubitka apetita, dispepsije (loša probava koju karakteriziraju žarenje, osjećaj nelagode i punoće u želucu) i flatulencije. U slučaju respiratornih bolesti, list metvice može pomoći ublažavanju kašla. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 4 godine.

## ČAJ KADULJA LIST, 40 g

**Šifra:** 00096 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu lista kadulje čiji su glavni sastojci eterično ulje (tujon), tanini, triterpeni i flavonoidi. Upotrebljava se oralno u obliku čaja za probavne tegobe (za dispepsiju, nadutost, žgaravicu, flatulenciju, kao antihidroik za sprječavanje prerenog znojenja) ili lokalno u obliku obloga (za dermatitis, ozljede, rane) ili grljivače (za gingivitis, stomatitis, faringitis). Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 18 godina.

## ČAJ MATIČNJAK, 40 g

**Šifra:** 00346 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu lista matičnjaka čiji su glavni sastojci eterično ulje, tanini, triterpenske kiseline i flavonoidi. Djeluje umirujuće pa se upotrebljava kod simptoma blagog stresa, anksioznosti, nemira, iritabilnosti, agitacije, pomaže pri spavanju i kod poremećaja sna. Matičnjak je također stomahik i karminativ te pomaže kod simptoma nadutosti, flatulencije te olakšava razgradnju i probavu masne hrane. Ekstrakt matičnjaka ima dokazano antivirusno djelovanje te se može upotrebljavati lokalno kod infekcija Herpes virusom. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ GOSPINA TRAVA, 40 g

**Šifra:** 00344 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Gospina trava se upotrebljava za liječenje blagih do srednje teških depresivnih epizoda, kod depresije tijekom menopauze te kod tjeskobe i nemira. Vrijeme uzimanja koje je potrebno za optimalan učinak je 4 tjedna.

## ČAJ KOPRIVA LIST, 40 g

**Šifra:** 00342 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu lista koprive čiji su glavni sastojci vitamini, minerali, flavonoidi i klorofil. Upotrebljava se za ispiranje mokraćnog trakta kod različitih tegoba jer djeluje diuretski, ima i protuupalno i imunomodulatorno djelovanje. Izvana se upotrebljava za njegu vlašića jer pomaže kod masne kose i prhuti. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ STOLISNIK BILJKA, 40 g

**Šifra:** 00340 | **Pakiranje:** 40 g | **PDV:** 25%

Sadrži drogu biljke stolisnika čiji su glavni sastojci eterično ulje (kamazulen, monoterpeni, seskviterpeni), flavonoidi i polini. Upotrebljava se kod povremenog gubitka apetita i za lučenje žući (kolagog, koleretik). Često se upotrebljava i kod blagih grčeva i upala gastrointestinalnog trakta koji uključuju nadutost i flatulenciju (spazmolitik, antiflogistik, karminativ, stomahik), a zbog svog protuupalnog i spazmolitičkog djelovanja djelotvoran je i kod blagih grčeva tijekom menstrualnog perioda.

Zbog svog antimikrobnog i protuupalnog djelovanja upotrebljava se i lokalno za zacjeljivanje rana, kao sredstvo za zaustavljanje krvarenja (hemostipik) te u obliku kupke za ublažavanje prekomjernog znojenja. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.



1.5.3.

# čajevi

## ČAJ ZA ČIŠĆENJE, 50 g

**Šifra:** 00101 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina cvijeta bazge, kore krkavine, ploda komorača, sjemena lana i lista sene. Dјeluje laksativno i upotrebljava se za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije, do 1 – 2 tjedna. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ ZA POMOĆ PRI MRŠAVLJENJU, 50 g

**Šifra:** 00112 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina cvijeta bazge, korijena zečjeg trna, sjemena lana, kukuruzne svile, kore krkavine i podanca pirike. Pospješuje izlučivanje tekućine iz organizma i regulira probavu. Izmjenom tvari organizam se čisti od štetnih tvari i olakšava se mršavljenje. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.



## ČAJ PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE, 50 g

**Šifra:** 00104 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina ploda aniša, ploda kima, ploda komorača i cvijeta kamilice. Dјeluju kao karminativi i stomachaci, tj. olakšavaju tegobe vezane za nadutost i flatulenciju, a kamilica pomaže i u ublažavanju grčeva probavnog trakta. Ne preporučuje se upotreba čaja duže od 2 tjedna te se ne preporučuje upotreba kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ ZA DOJILJE, 100 g

**Šifra:** 02561 | **Pakiranje:** 100 g | **PDV:** 25%

Sadrži droge ploda kima, ploda komorača, islandskog lišaja, lista koprive, lista matičnjaka, biljke bosiljka te lista bijelog sljeza.



## ČAJ ZA BUBREGE I MJEHUR, 50 g

**Šifra:** 00102 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina lista medvjete, zeleni čistaca, ploda divlje ruže i podanca pirike. Upotrebljava se kao pomoć pri liječenju različitih tegoba urinarnog trakta, uključujući cistitis, uretritis, prostatitis, nefrolitijazu i benignu hiperplaziju prostate. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

## ČAJ ZA BOLJI RAD PROSTATE, 50 g

**Šifra:** 00116 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina zeleni vrbolike, zeleni kilavice, zeleni poljske preslice, korijena peršina i korijena koprive. Upotrebljava se za ublažavanje simptoma donjeg dijela urinarnog trakta kao što su učestalo mokrenje, pojčan nagon za mokrenjem, bolno ili nepotpuno mokrenje te smanjen mlaž urina. Čajna mješavina olakšava i potiče mokrenje, djeluje protuupalno te olakšava simptome povećane prostate. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

## ČAJ ZA ŽUČ I JETRA, 50 g

**Šifra:** 00109 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina lista i korijena maslačka, zeleni turice, zeleni kićice, lista artičoke i zeleni dimnjače. Upotrebljava se za poticanje lučenja žuči (koleretik i kolagog), pojčava lučenje sline, stimulira apetit, snižava povišeni kolesterol i potiče regeneraciju jetre. Čaj treba piti pola sata prije jela da se potakne probava i olakša razgradnja masne hrane. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina, osim po preporuci liječnika.

## ČAJ ZA UMIRENJE I SPAVANJE, 50 g

**Šifra:** 00108 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Čajna mješavina korijena odoljena, lista matičnjaka, lista paprene metvice i češerića hmelja. Upotrebljava se kod različitih anksioznih stanja kao što su napetost, nemir, uznemirenost, strah i agresivnost te kao hipnotik u liječenju nesanice, kao i za ublažavanje simptoma psihičkog stresa. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

1.5.4.

## Topikalni pripravci

# Topikalni

### BEBIBALM, balzam, 50 mL

**Šifra:** 00131 | **Pakiranje:** 50 mL | **PDV:** 25%

Sadrži eterična ulje klekovine, eukaliptusa i terpentinsko ulje bora koji djeluju antiseptički te olakšavaju disanje i iskašljavanje.

Može se primjenjivati lokalno mazanjem na kožu (2 – 3 puta dnevno namazati na područje prsa i vrata) ili inhalacijski (grudica balzama veličine graška stavi se u posudu s vrućom vodom i inhalira se nad njom 5 – 10 minuta). Može se upotrebljavati kod djece starije od 30 mjeseci (2,5 godine) i odraslih.



### MENTOBALM, balzam, 50 mL

**Šifra:** 00050 | **Pakiranje:** 50 mL | **PDV:** 25%

Sadrži eterična ulje klekovine, eukaliptusa i terpentinsko ulje bora koji imaju antiseptički i antisretni učinak te kamfor i mentol koji povećavaju prokrvljenost na mjestu primjene. Upotrebljava se za ublažavanje simptoma bolesti dišnog sustava povezanih s prehladom te za liječenje reumatske boli.

Upotrebljava se mazanjem na kožu ili inhalacijski, jednakim postupcima kao Bebibalm. Ukoliko se upotrebljava za reumatske bolove, utrlja se 3 puta dnevno na bolno područje. Namijenjen je za djecu iznad 12 godina i odrasle, a mogu ga upotrebljavati i djeca starija od 6 godina, ali pod nadzorom liječnika.



### GAVEZOVA MAST, 50 mL

**Šifra:** 02406 | **Pakiranje:** 50 mL | **PDV:** 25%

Gavezova mast sadrži tinkturu korijena gaveza, koji djeluje protuupalno i analgetski te nevenovo ulje, koje doprinosi protuupalnom učinku pripravka.

Gavezova mast se upotrebljava kod sportskih ozljeda, uganuća, iščašenja, podljeva, osteoartritisa, boli u ledima, upale mišića i zglobova.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na bolno područje, do 14 dana.

Mogu je upotrebljavati odrasli i djeca starija od 3 godine.



### PLANTAGEL, gel, 50 g

**Šifra:** 00153 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 25%

Plantagel je emulzijski gel koji sadrži ekstrakte kamilice i nevena. Kamilica pospješuje zacjeljivanje rana i smiruje iritaciju kože, dok neven zahvaljujući visokom udjelu flavonoida djeluje protuupalno i ubrzava stvaranje novih stanica.

Plantagel se upotrebljava za umirenje kožnih reakcija različitih uzroka: oštećene i iritirane kože, osipa, ranica, sunčanih i drugih opeketina, opeketina meduza, uboda i ugriza insekata, nakon depilacije i brijanja te kod osipa uslijed znojenja.

Upotrebljava se kod odraslih i djece starije od 6 mjeseci, a može se primjenjivati 2 – 6 puta dnevno.



### NEVENOVA MAST, 100 mL

**Šifra:** 00145 | **Pakiranje:** 100 mL | **PDV:** 25%

Sadrži tekući ekstrakt nevenovog cvijeta i djevičansko maslinovo ulje. Pomaže kod blažih oboljenja i oštećenja kože: ogrebotina, ranica, dekubitusa, zatvorenih opeketina, suhih ekcema, uboda i ugriza insekata te sunčanih opeketina.

Primjenjuje se 3 – 4 puta dnevno u tankom sloju na zahvaćeno mjesto na koži. Nevenova mast ne sadrži konzervante, boje, ni mirise.

1.5.5.

# Kapsule



**Kapsule biljnog podrijetla**

**KARBOFENULIN, 25 kapsula**

**Šifra:** 00149 | **Pakiranje:** 25 kap. | **PDV:** 25%

Sastoji se od aktiviranog medicinskog ugljena, koji je nespecifični probavni adsorbens i inulina, koji potiče obnovu crijevne flore stimuliranjem rasta i aktivnosti korisnih crijevnih bakterija.

Djeca 3 – 12 godina primjenjuju 2 – 4 kapsule 1 – 2 puta dnevno, a djeca starija od 12 godina i odrasli primjenjuju 4 – 7 kapsula 3 – 4 puta dnevno.

Sadržaj kapsule se može istresti i pomiješati s malo tekućine.

Kapsule su biljnog podrijetla i pogodne su za vegane i vegeterijance.

**GALENSKI LABORATORIJ**  
**PLANTEA**  
**Karbofenulin**  
Aktivirani ugljen s inulinom  
25 kapsula



1.6.1.

# Pripravci za njegu lica i tijela



## BALZAM ZA USNE, 5 mL

**Šifra:** 02121 | **Pakiranje:** 5 mL | **PDV:** 25%

Sadrži karite maslac, ulje ricinusa, jojobe i badema, eterično ulje naranče i tokoferol. Hrani osjetljivu kožu usana, stvara zaštitni sloj te ih tako štiti od isušivanja i hladnoće.

## LOSION ZA SUNČANE OPEKOTINE, 200 mL

**Šifra:** 00481 | **Pakiranje:** 200 mL | **PDV:** 25%

Emulzija kalcijevog hidroksida s uljem lana pogodna je za tretiranje svih vrsta sunčanih opekotina. Smiruje upalu, ublažava osjećaj peckanja i žarenja kože te postupno smanjuje bol i crvenilo.

Primjenjuje se 3 puta dnevno laganim utapkanjem na oštećene dijelove kože.

## KAMFORNI LOSION, 150 mL

**Šifra:** 00455 | **Pakiranje:** 150 mL | **PDV:** 25%

Čisti i njeguje masnu kožu, smanjuje prekomjerno lučenje žljezda lojnica, otvara i čisti pore te djeluje antibakterijski.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na područje kože zahvaćeno nepravilnostima.

## LOSION ZA ZDRAVO VLASIŠTE, 150 mL

**Šifra:** 00573 | **Pakiranje:** 150 mL | **PDV:** 25%

Losion za zdravo vlasište sadrži djelatne tvari iz korijena koprive i lista ružmarina. Korijen koprive pomaže kod ispadanja kose i prhuti, dok list ružmarina potiče cirkulaciju vlasišta, poboljšava opskrbu dlake hranjivim tvarima i tako jača folikule dlake. Zbog svog antiseptičkog djelovanja, Losion za zdravo vlasište regulira sekreciju sebuma, čisti kožu i otvara pore.

Primjenjuje se u vlasištu 2 puta dnevno, ujutro i navečer, bez ispiranja.



## PANTENOL KOMPLEKS LOSION, 150 mL

**Šifra:** 02838 | **Pakiranje:** 150 mL | **PDV:** 25%

Djelatne tvari su dekspantenol i alantoin. Alantoin je aktivator staničnog rasta pa tako potiče epitelizaciju i regeneraciju kože te ima snažno protuupalno djelovanje. Upotrebljava se kod atopijskog dermatitisa, ekcema, psorijaze, akni, opeketina, hiperkeratoza, pelenskog osipa i drugih upalnih stanja kože.

Primjenjuje se do 5 puta dnevno na oboljelo područje kože.



## PANTENOL OTOPINA, sprej, 100 mL

**PANTENOL KREMA, 30 g**  
**PANTENOL MAST, 30 g**

Pantenol otopina, sprej  
Pantenol krema  
Pantenol mast

**Šifra:** 02065 | **Pakiranje:** 100 mL | **PDV:** 25%  
**Šifra:** 02776 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%  
**Šifra:** 00267 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%

Djelatna tvar je dekspantenol, provitamin B5, koji sprječava gubitak vode kod suhe i vrlo suhe kože, pojačava obrambenu funkciju kod osjetljive i nadražene kože, ublažava upalna stanja i smanjuje bol i crvenilo. Mogu se upotrebljavati kod različitih kožnih tegoba kao što su crvenilo, opeketina, pelenski osip i druga upalna stanja kože.

Pantenol losion ne sadrži alkohol pa se može upotrebljavati kod upala usne šupljine, za njegu dojki nakon dojenja te na manjim ranama i ogrebotinama.

Primjenjuju se na zahvaćena područja kože do 5 puta dnevno.



1.6.1.

## Pripravci za njegu lica i tijela

### DJEČJA MAST, 100 mL, 250 mL, 500 mL

Šifra: 00071	Pakiranje: 100 mL	PDV: 25%
Šifra: 00403	Pakiranje: 250 mL	PDV: 25%
Šifra: 02689	Pakiranje: 500 mL	PDV: 25%

Sadrži vazelin, lanolin i bademovo ulje. Njeguje dječju kožu, zadržava vlažnost te štiti od pelenskog osipa, iritacije i crvenila.

Može se upotrebljavati i kod ležećih bolesnika za zaštitu od dekubitusa.



### DJEČJA MAST S BALZAMOM, 80 mL

Šifra: 00037	Pakiranje: 80 mL	PDV: 25%
--------------	------------------	----------

Sadrži cinkov oksid, benzojevu tinkturu i peruanski balzam u vazelinu i lanolinu.

Upotrebljava se kod crvenila, pelenskog osipa i ostalih blažih upalnih promjena na koži djece i odraslih.

Može se upotrebljavati i kod ležećih bolesnika za zaštitu od dekubitusa.



1.7.1.

**Otopine****ACIDI BORICI 3%, otopina**

Šifra: 00030	Pakiranje: 200 mL	PDV: 25%
Šifra: 00446	Pakiranje: 300 mL	PDV: 25%
Šifra: 00525	Pakiranje: 500 mL	PDV: 25%
Šifra: 00423	Pakiranje: 1000 mL	PDV: 25%

**ALKOHOL 70%**

Šifra: 00425	Pakiranje: 100 mL	PDV: 25%
Šifra: 00424	Pakiranje: 200 mL	PDV: 25%
Šifra: 00465	Pakiranje: 300 mL	PDV: 25%
Šifra: 00448	Pakiranje: 500 mL	PDV: 25%
Šifra: 00434	Pakiranje: 1000 mL	PDV: 25%
Šifra: 01846	Pakiranje: 5000 mL	PDV: 25%

**ALKOHOL 70% sprej**

Šifra: 00452	Pakiranje: 50 mL	PDV: 25%
Šifra: 00441	Pakiranje: 200 mL	PDV: 25%
Šifra: 02927	Pakiranje: 500 mL	PDV: 25%

**RIVANOL 0,1%, otopina, 100 mL**

Šifra: 00426	Pakiranje: 100 mL	PDV: 25%
--------------	-------------------	----------

**HIDROGEN PEROKSID 3%, otopina**

Šifra: 01904	Pakiranje: 30 mL	PDV: 25%
Šifra: 01903	Pakiranje: 100 mL	PDV: 25%
Šifra: 00464	Pakiranje: 1000 mL	PDV: 25%

**KALIJEV PERMANGANAT 1%, koncentrirana otopina, 30 mL**

Šifra: 00557	Pakiranje: 30 mL	PDV: 25%
--------------	------------------	----------

Razrijetena otopina kalijevog permanganata (0,01%) se upotrebljava kao antiseptik i adstringens. Upotrebljava se za ispiranje i liječenje gnojnih rana te za čišćenje kože kod ekcema, posebno vlažnih (npr. vodene kozice).

16 kapi (1g) otopine se pomiješa s 1dL vode i tako pripremljena otopina se može primjenjivati više puta dnevno.



1.8.

**OSTALI PRIPRAVCI**

1.8.1.

# Ostali pripravci

## GORKA SOL, 30 g

**Šifra:** 00060 | **Pakiranje:** 30 g | **PDV:** 25%



Djelatna tvar je magnezijev sulfat koji djeluje kao sredstvo za čišćenje crijeva. Upotrebljava se za olakšavanje crijeva kod povremenog zatvora. Gorka sol povećava volumen crijevnog sadržaja čime se povećava pritisak u crijevima i izaziva spontana peristaltika.

Primjenjuje se 1-2 žlice gorke soli otopljene u 1 dcL mlake vode. Mogu je upotrebljavati odrasli i djeca starija od 12 godina.

## ULJE BADEMA

**Šifra:** 00428 | **Pakiranje:** 60 mL | **PDV:** 25%

## ULJE JOJOBE

**Šifra:** 00432 | **Pakiranje:** 60 mL | **PDV:** 25%

## ULJE RICINUSA

**Šifra:** 00296 | **Pakiranje:** 30 mL | **PDV:** 25%

## PARAFINSKO ULJE

**Šifra:** 00447 | **Pakiranje:** 100 mL | **PDV:** 25%

## H.A. LAVANDULAE AETHEROLEUM

**Šifra:** 02036 | **Pakiranje:** 30 mL | **PDV:** 25%

## H.A. ROSMARINI AETHEROLEUM

**Šifra:** 02035 | **Pakiranje:** 30 mL | **PDV:** 25%

## ETERIČNO ULJE ČAJEVCA

**Šifra:** 00508 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

## ANIŠ ETERIČNO ULJE

**Šifra:** 00451 | **Pakiranje:** 10 mL | **PDV:** 25%

## GLICEROL

**Šifra:** 00450 | **Pakiranje:** 100 g | **PDV:** 25%

## CINK OKSID PASTA

**Šifra:** 01873 | **Pakiranje:** 500 g | **PDV:** 25%

## MAST S RIBLJIM ULJEM

**Šifra:** 00577 | **Pakiranje:** 200 g | **PDV:** 25%

## BENZIN MEDICINSKI

**Šifra:** 00239 | **Pakiranje:** 150 mL | **PDV:** 25%

## ANALITIČKI SET

**Šifra:** 00280 | **Pakiranje:** 30 reagensa | **PDV:** 25%



**GALENSKI PRIPRAVCI  
NA LISTIHZZO-A**

2.1.

# Kapi za oči

## ACIDI BORICI 1%, 2% i 3% kapi za oči, 10 mL

Acidi Borici 1%	Šifra: 00278	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%
Acidi Borici 2%	Šifra: 01830	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%
Acidi Borici 3%	Šifra: 01831	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%

Djelatna tvar je boratna kiselina koja djeluje kao antiseptik protiv bakterijskih i gljivičnih upala oka i uha. Upotrebljavaju se pri ispiranju i terapiji laksih upala oka (konjunktivitis, iritacija oka). Ublažavaju simptome upale oka: crvenilo, pojačano suzenje, bol, osjećaj bockanja i peckanja.

Primjenjuju se 2 – 6 puta dnevno kapanjem 1 kapi u bolesno oko.

Mogu se upotrebljavati kod odraslih i djece iznad 2 godine starosti. Acidi borici kapi za oči se mogu upotrebljavati kod djece mlade od 2 godine samo pod liječničkim nadzorom.

## NATRIJEV JODID 1% kapi za oči, 5 mL

Šifra: 00564	Pakiranje: 5 mL	PDV: 5%
--------------	-----------------	---------

Natrijev jodid kapi za oči se upotrebljavaju za ispiranje oka kao dodatna terapija kod podupiranja procesa resorpcije u oku (posebno kod eksudacije, krvarenja, mrene (katarakte) i nakupljanja tekućine različitih etiologija).

Točno doziranje i trajanje terapije određuje oftalmolog. Uobičajeno doziranje je 1–2 kapi 2 – 4 puta dnevno u konjunktivalnu vrećicu.

Može se upotrebljavati kod svih dobnih skupina osim novorođenčadi.

## TETRAKAIN 0,5% kapi za oči, 10 mL

Šifra: 00558	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%
--------------	------------------	---------

Tetrakain kapi za oči sadrže tetrakainklorid, derivat para-aminobenzojeve kiseline, koji djeluje lokalno anestetski i pogodan je za upotrebu u oftalmologiji.

Tetrakain kapi za oči dovode do duble anestezije oka pa su pogodne za upotrebu kod manjih operativnih zahvata (npr. uklanjanje stranih tijela s rožnice ili odstranjivanje šavova na rožnici).

Anestezija oka započinje unutar 25 sekundi od ukapavanja i traje otprilike 15 minuta. Najčešće se ukapava 1 – 2 kapi u donju konjunktivalnu vrećicu jednog ili oba oka prije dijagnostičkog testa ili terapijskog zahvata.



## ATROPIN 0,5% i 1% kapi za oči, 10 mL

Atropin 0,5%	Šifra: 00512	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%
Atropin 1%	Šifra: 00513	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%

Djelatna tvar je atropinsulfat, midrijatik (lijek koji širi zjenicu) i cikloplegik (lijek koji opušta mišiće odgovorne za akomodaciju oka).

Upotrebljavaju se kod upale oka (uveitis ili iritis) i prije određenih dijagnostičkih pregleda. Također se upotrebljavaju za dijagnostiku refrakcije kod djece mlade od 6 godina i djece s konvergentnim strabizmom (škiljavost).

Za upalne bolesti oka (uveitis, iritis) se primjenjuju 1 – 4 puta dnevno po 1 – 2 kapi.

Za refrakciju se primjenjuju 2 puta dnevno po 1 kap 1–2 dana prije pregleda ili 1 – 2 kapi 1 sat prije pregleda za odrasle ili 1 – 2 kapi 1 – 3 dana prije pregleda za djecu mlađu od 12 godina.

Mogu se upotrebljavati kod odraslih i djece iznad 3 mjeseca starosti.



## PILOKARPIN 1% i 2% kapi za oči, 10 mL

Pilocarpin 1%	Šifra: 00563	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%
Pilocarpin 2%	Šifra: 00559	Pakiranje: 10 mL	PDV: 5%

Djelatna tvar je pilokarpin, izravni parasimpatomimetik jakog djelovanja (stimulator muskarinskih receptora).

Upotrebljavaju se kod kroničnog glaukoma širokog i uskog kuta, akutnog glaukoma uskog kuta, za smanjenje intraokularnog tlaka prije operacije, za otklanjanje sinehija između šarenice i leće naizmjenično s midrijaticima i kod indukcije mioze tj. otklanjanja midrijaze uzrokovane pripravcima koji izazivaju cikloplegiju.

Primjena je najčešće 1 – 2 kapi 3 – 4 puta dnevno u donju konjunktivalnu vrećicu. Iznimno, 1 kap svakih 5 minuta do postizanja mioze za indukciju mioze ili 3 puta unutar 30 minuta za akutni glaukom uskog kuta. Koncentracija i učestalost primjene je određena ozbiljnošću zdravstvenog stanja.



2.2.

## Kapi za nos



2.3.

## Topikalni pripravci

# Topikalni



### BENZILBENZOAT MAZILO, 150 mL

Šifra: 00059 | Pakiranje: 150 mL | PDV: 5%

Djelatna tvar je benzilbenzoat koji se upotrebljava za lokalno liječenje svraba (skabies) i ušljivosti tijela (pedikuloze).

Kod svraba, Benzilbenzoat mazilo se treba ravnomjerno vatom primijeniti na suhu kožu cijelog tijela (trup i ekstremiteti) od vrata prema stopalima (uključujući i tabane), ostaviti 24 sata i potom se isprati u toploj vodi. Preporučuje se ponoviti postupak još jednom unutar 5 dana.

Kod ušljivosti, Benzilbenzoat mazilo se primjeni na zahvaćeno područje te nakon 24 sata ispere topлом vodom. Postupak možete ponoviti nakon 7 dana ako je ostalo živilih ušiju. Kod težih slučajeva postupak se može ponoviti 2 do 3 puta.

Upotreba kod djece moguća je samo pod liječničkim nadzorom, i to samo u slučaju ozbiljne potrebe kada se razrjeđuje s vodom u omjeru 1:3 (1 Benzilbenzoat mazilo, 3 voda) kod dojenčadi starije od 2 mjeseca ili u omjeru 1:1 kod djece.



### ERITROMICIN 2% otopina, 100 g

Šifra: 01958 | Pakiranje: 100 g | PDV: 5%

Eritromicin je antibiotik koji zaustavlja rast bakterija. Upotrebljava se za lokalno liječenje upalno promijenjenih, blagih do umjerenih akni.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na zahvaćenom području, ne dulje od 6 mjeseci. Maksimalno poboljšanje najčešće nastupa za 6-8 tjedana.

### KLINDAMICIN 0,6% otopina, 100 g

Šifra: 01957 | Pakiranje: 100 g | PDV: 5%

Klindamicin je antibiotik koji zaustavlja rast bakterija. Upotrebljava se za lokalno liječenje upalno promijenjenih, blagih do umjerenih akni.

Primjenjuje se 2 puta dnevno na zahvaćenom području. Poboljšanje najčešće nastupa za oko 6 tjedana, a maksimalna učinkovitost se postiže nakon 10-12 tjedana upotrebe.

2.3.

## Topikalni pripravci



### PERMOGEL, 50 g

**Šifra:** 00272 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 5%

Djelatna tvar je permethrin, 1%, sinteticki insekticid iz skupine piretroida, koji djeluje protiv širokog spektra nametnika uključujući uši, krpelje, buhe, grinje i druge člankonošce.

Upotrebljava se kod ušljivosti glave i stidne ušljivosti.

Kod ušljivosti glave se primjeni na vlažnu kosu, uključujući zatiljak i područje iza ušiju, ostavi se djelovati 10 minuta, potom se ispere, a kosa se dobro iščešljaj gustim češljem. Postupak se ponovi za 7 – 10 dana ukoliko je potrebno.

Kod stidne ušljivosti se primjeni na pubično područje, potom ispere nakon 10 minuta te se postupak ponovi za 7 – 10 dana ukoliko je potrebno.

Može se upotrebljavati kod odraslih, djece i dojenčadi starije od 2 mjeseca.



### SKABIGEL, 50 g

**Šifra:** 02125 | **Pakiranje:** 50 g | **PDV:** 5%

Djelatna tvar je permethrin, 5%, sinteticki insekticid iz skupine piretroida, koji djeluje protiv širokog spektra nametnika uključujući uši, krpelje, buhe, grinje i druge člankonošce.

Upotrebljava se kod svraba (scabies).

Primjenjuje se na suhu i hladnu kožu od vrata do stopala, ne isključujući područje između prstiju ruke i stopala te područje ispod noktiju, a kod djece čak na kosu, čelo i sljepoočnice. Ostavi se djelovati

8 – 14 sati prije ispiranja. Po preporuci liječnika cijeli postupak se može ponoviti za 7 dana.

Može se upotrebljavati kod odraslih, djece i dojenčadi starije od 2 mjeseca.

### TEKUĆI PUDER s anestezinom, 100 g

**Šifra:** 00469 | **Pakiranje:** 100 g | **PDV:** 5%

Djelatne tvari su benzokain, cinkov oksid i talk. Djeluje kao anestetik i adstringens. Upotrebljava se za smirivanje svrbeža kože različitih uzroka (npr. vodene kozice, alergija).

### TEKUĆI PUDER, 100 g

**Šifra:** 00468 | **Pakiranje:** 100 g | **PDV:** 5%

### ALKOHOL 70%, 200 g

**Šifra:** 00555 | **Pakiranje:** 200 g | **PDV:** 5%

### HIDROGEN PEROKSID 3%, kapi za uho, 20 g

**Šifra:** 00536 | **Pakiranje:** 20 g | **PDV:** 5%

### HIDROGEN PEROKSID 3%, otopina, 100 g

**Šifra:** 00520 | **Pakiranje:** 100 g | **PDV:** 5%

### RIVANOL 0,1% otopina, 300 g

**Šifra:** 00511 | **Pakiranje:** 300 g | **PDV:** 5%





**LJEKARNA**  
Splitsko-dalmatinske županije



**GALENSKI  
LABORATORIJ**

---

**ODJEL PRODAJE**

T: 385 21 319 106 | E: [galenski.prodaja@ljekarnasdz.hr](mailto:galenski.prodaja@ljekarnasdz.hr)

---

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje,  
T: 385 21 340 711 | F: 385 21 340 713 | E: [ljekarnasdz@ljekarnasdz.hr](mailto:ljekarnasdz@ljekarnasdz.hr)

---

[www.ljekarnasdz.hr](http://www.ljekarnasdz.hr)