

Acidi Borici kapi za oko, otopina 1%, 2%, 3% ——— 10 g

10 mg/g	_____	boratna kiselina
20 mg/g	_____	boratna kiselina
30 mg/g	_____	boratna kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Acidi borici kapi za oko i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Acidi borici kapi za oko
3. Kako upotrebljavati Acidi borici kapi za oko
4. Koji su neželjeni učinci Acidi borici kapi za oko
5. Kako čuvati Acidi borici kapi za oko
6. Dodatne informacije

ŠTO SU ACIDI BORICI KAPI ZA OKO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Djelatna tvar Acidi borici kapi za oko je boratna kiselina koja djeluje kao blagi antiseptik, a koristi se i protiv gljivičnih te bakterijskih infekcija. Antiseptičko djelovanje Acidi borici kapi za oko važno je prilikom ispiranja oka i u terapiji lakših upala oka (konjunktivitis, iritacija oka).

Acidi borici kapi za oko ublažavaju simptome upale oka: crvenilo, pojačano suzenje, bol, osjećaj nelagode i pečenja. Također, pomažu kod iritacije oka uzrokovane vanjskim čimbenicima poput prašine, dima, vjetra, hladnoće, jakog svjetla i trljanja oka rukama.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ACIDI BORICI KAPI ZA OKO

Nemojte upotrebljavati Acidi borici kapi za oko ako:

- ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- imate otvorene rane oko očiju

Budite oprezni s Acidi borici kapima za oko:

- ako ste nedavno imali operaciju oka

Prilikom upotrebe Acidi borici kapi za oko potrebno je ukloniti kontaktne leće iz oka. Izravan dodir kontaktnih leća s kapima treba izbjegavati zbog mogućeg zamućenja. Pričekajte barem 15 minuta od primjene kapi, zatim vratite kontaktne leće u oko. Upotrebu kod djece mlađe od 2 godine potrebno je provoditi pod nadzorom liječnika.

Upotreba Acidi borici kapi za oko s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Acidi borici kapi za oko bez preporuke liječnika.

KAKO UPOTREBLJAVATI ACIDI BORICI KAPI ZA OKO

Acidi borici kapi za oko uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Acidi borici kapi za oko posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:

DOB	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Dojenčad i djeca do 2 godine	1 kap u bolesno oko	2 puta 1 kap u bolesno oko
Djeca iznad 2 godine	1 kap u bolesno oko	3 puta 1 kap u bolesno oko
Odrasli	1 kap u bolesno oko	6 puta 1 kap u bolesno oko

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj. Nakon otvaranja bočice, zatvarač treba ostati u ruci s otvorom okrenutim prema dolje.



Slika 2. U sjedećem ili ležećem položaju, nagnite glavu unatrag i laganim stiskanjem bočice ukapajte jednu kap u donju konjunktivalnu vrećicu oka. Pogledajte prema dolje i lagano zatvorite oko 1 do 2 minute. Blagim pritiskom prsta na kut oka kod nosa možete smanjiti otjecanje lijeka iz oka. Pokušajte ne treptati i nemojte trljati oko. Vratite zatvarač na bočicu i dobro je zatvorite.

Prije upotrebe kapi operite ruke. Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za oko smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati oko kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 3 dana, potrebno je prekinuti primjenu kapi i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Acidi borici kapi za oko nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za oko od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Acidi borici kapi za oko

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Acidi borici kapi za oko i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Acidi borici kapi za oko

Ako ste zaboravili upotrijebiti Acidi borici kapi za oko kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Acidi borici kapi za oko kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ACIDI BORICI KAPI ZA OKO

Poput svih lijekova, Acidi borici kapi za oko mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon ukapavanja Acidi borici kapi za oko vrlo rijetko se može pojaviti reakcija preosjetljivosti sa simptomima osipa te crvenih, otečenih ili vodenastih očiju. U rijetkim slučajevima može se nakon ukapavanja Acidi borici kapi za oko osjetiti nelagoda.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Acidi borici kapi za oko i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI ACIDI BORICI KAPI ZA OKO

Acidi borici kapi za oko čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju. Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Acidi borici kapi za oko se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 20 dana.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Acidi borici kapi za oko i sadržaj pakiranja

Acidi borici kapi za oko su bistra, bezbojna otopina. 10 g otopine u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g otopine Acidi borici 1% kapi za oko sadržava 10 mg boratne kiseline

1 g otopine Acidi borici 2% kapi za oko sadržava 20 mg boratne kiseline

1 g otopine Acidi borici 3% kapi za oko sadržava 30 mg boratne kiseline

Pomoćne tvari: voda, pročišćena

Način izdavanja

Acidi borici kapi za oko dostupne su na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

02365/1