

Aftagal sprej za usnu sluznicu, otopina

30 mL

5 mg/mL	_____	lidokainklorid
1,7 mg/mL	_____	eterično ulje australskog čajevca
50 mg/mL	_____	dekspantenol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Aftagal sprej i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Aftagal sprej
3. Kako upotrebljavati Aftagal sprej
4. Koji su neželjeni učinci Aftagal spreja
5. Kako čuvati Aftagal sprej
6. Dodatne informacije

ŠTO JE AFTAGAL SPREJ I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Aftagal sprej sadrži lidokainklorid, eterično ulje australskog čajevca i dekspantenol. Lidokainklorid je lokalni anestetik koji smanjuje osjet boli što omogućava olakšano žvakanje i gutanje. Eterično ulje australskog čajevca djeluje antiseptički- sprječava rast i razvoj mikroorganizama: virusa, bakterija i gljivica. Dekspantenol je derivat pantotenske kiseline, vitamina koji pospješuje proces cijeljenja rana te štiti i smiruje upalne promjene na sluznici.

Aftagal sprej se upotrebljava kod:

- afti
- otežanog gutanja
- upale desni i sluznice usta
- blažih infekcija u usnoj šupljini i ždrijelu

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI AFTAGAL SPREJ

Nemojte upotrebljavati Aftagal sprej:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod djece mlađe od 6 godina
 - ako imate methemoglobinemiju-vrlo rijedak poremećaj krvi kod kojeg je onemogućeno prenošenje kisika krvlju do ostalih stanica u tijelu

Budite oprezni s Aftagal sprejem ako:

- imate povišenu tjelesnu temperaturu, jake bolove u ždrijelu i teško gutate
- imate ozljede ili lezije usne šupljine i sluznice ždrijela
- bolujete od zatajenja i poremećaja rada srca
- uzimate antiaritmike
- imate poremećaj funkcije jetre
- imate astmu ili bronhospazam
- bolujete od epilepsije ili mijastenije gravis

Pazite da sprej ne ubrizgate u oči i da ga ne udišete (zadržite dah dok nanosite sprej). U slučaju kontakta s očima, oči obilno isprati vodom.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, prije upotrebe ovog pripravka posavjetujte se sa svojim liječnikom. Treba paziti da otopina ne dođe u dodir s očima. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Aftagal spreja s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Aftagal sprej bez preporuke liječnika.

KAKO UPOTREBLJAVATI AFTAGAL SPREJ

Aftagal sprej uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Aftagal sprej posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:


DOB	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca od 6 do 12 godina	1 potisak spreja	3 do 5 puta na dan
Djeca starija od 12 godina i odrasli	2 potiska spreja	do 6 puta na dan

Aftagal sprej se ne smije uzimati neposredno prije ili tijekom konzumacije jela i pića jer učinak lokalnog anestetika lidokaina može uzrokovati pripremnu utrnulost usne župljine i grla te time utjecati na gutanje. Nemojte jesti niti piti najmanje jedan sat nakon primjene lijeka, a najmanje pola sata nakon primjene nemojte prati zube.

Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Nemojte koristiti kod djece koja ne mogu zadržati dah tijekom ubrizgavanja spreja.

Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu spreja smije koristiti samo jedna osoba.

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe trebate okrenuti nastavak za raspršivanje pod pravim kutom u odnosu na bočicu.



Slika 2. Usta treba jako otvoriti, usmjeriti sprej prema mjestu upale u ustima ili u ždrijelu i pritisnuti raspršivač. Zadržite dah tijekom ubrizgavanja spreja.

Nakon upotrebe nastavak za raspršivanje treba okrenuti prema dolje pri čemu se blokira raspršivač. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 5 dana, potrebno je prekinuti primjenu spreja i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Aftagal spreja nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu spreja od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Prvi znakovi predoziranja su poremećaji kardiovaskularnog i središnjeg živčanog sustava. Poremećaj središnjeg živčanog sustava se očituje kao nemir, zbunjenost, zujanje u ušima, vrtoglavica, nistagmus, zamućen vid, mučnina, povraćanje, tremor i konvulzije. Kardiovaskularne nuspojave su pad krvnog tlaka (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), srčani zastoj (arest). Nakon upotrebe prevelikih doza (više od jedne bočice spreja na dan) mogu se javiti smetnje pri gutanju (smanjena kontrola refleksa gutanja).

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Aftagal spreja

U slučaju gutanja većeg sadržaja Aftagal spreja (npr. cijela bočica) odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Aftagal sprej i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Aftagal sprej

Ako ste zaboravili upotrijebiti Aftagal sprej kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Aftagal spreja kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI AFTAGAL SPREJA

Poput svih lijekova, Aftagal sprej može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti (alergijska reakcija). Ako primijetite simptome kao što su osip, svrbež, otok kože i otežano disanje odmah potražite pomoć liječnika. Ako ste preosjetljivi na lidokain (poznat i pod nazivom ksilokain), postoji mogućnost da ste preosjetljivi i na druge lokalne anestetike iste skupine (npr. benzokain, prokain, tetrakain).

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati sprej i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI AFTAGAL SPREJ

Aftagal sprej čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju. Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Aftagal sprej se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 6 mjeseci. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Aftagal spreja i sadržaj pakiranja

Aftagal sprej je blago zamućena, svijetložuta otopina s okusom metvice i limuna. 30 mL otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj, mehaničkim raspršivačem i nastavkom za raspršivanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine sadržava 5 mg lidokainklorida, 1,7 mg eteričnog ulja australskog čajevca i 50 mg dekspantenola

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; polisorbat 20; eterično ulje limuna; eterično ulje paprene metvice; saharinnatrij; kalijev sorbat

Način izdavanja

Aftagal sprej dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

02023/1