

Atropin kapi za oko, otopina 0,5%, 1% ——— 10 g

5 mg/g _____ atropinsulfat
10 mg/g _____ atropinsulfat

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Atropin kapi za oko i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Atropin kapi za oko
3. Kako upotrebljavati Atropin kapi za oko
4. Koji su neželjeni učinci Atropin kapi za oko
5. Kako čuvati Atropin kapi za oko
6. Dodatne informacije

ŠTO SU ATROPIN KAPI ZA OKO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Atropin kapi za oko sadržavaju djelatnu tvar atropinsulfat, midrijatik (lijek koji širi zjenicu) i cikloplegik (lijek koji opušta mišiće odgovorne za akomodaciju oka). Atropin kapi za oko se upotrebljavaju kod upale oka, prije određenih dijagnostičkih pregleda i za dijagnozu refrakcije kod djece mlađe od 6 godina te djece s konvergentnim strabizmom.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ATROPIN KAPI ZA OKO

Nemojte upotrebljavati Atropin kapi za oko ako:

- ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- imate povišen očni tlak (glaukom zatvorenog kuta)

Budite oprezni s Atropin kapima za oko ako imate:

- visoku temperaturu
- tamnu boju očiju, tada teže dolazi do širenja zjenice (nemojte upotrebljavati više kapi nešto što je potrebno)
- srčane tegobe poput ubrzanog rada srca (tahikardije)

Ne preporučuje se upotreba Atropin kapi za oko kod dojenčadi mlađe od 3 mjeseca.

Tijekom liječenja Atropin kapima za oko ne smiju se nositi meke kontaktne leće jer može doći do obojenja leća. Prilikom upotrebe Atropin kapi za oko potrebno je ukloniti tvrde kontaktne leće iz oka. Izravan dodir kontaktnih leća s kapima treba izbjegavati zbog mogućeg zamućenja. Pričekajte barem 15 minuta od primjene kapi zatim vratite kontaktne leće u oko.

Nastojte zaštititi oči od jake svjetlosti dok su vam zjenice proširene.

Upotreba Atropin kapi za oko s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Učinak atropina može biti pojačan primjenom ostalih lijekova iz skupine antimuskarinika.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Atropin kapi bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Atropin kapi za oko

Atropin kapi za oko sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 g otopine.

Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća.

Benzalkonijev klorid može također uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaj rožnice (prozirni sloj prednjeg dijela oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

KAKO UPOTREBLJAVATI ATROPIN KAPI ZA OKO

Atropin kapi za oko uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Atropin kapi za oko posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj. Nakon otvaranja bočice, zatvarač treba ostati u ruci s otvorom okrenutim prema dolje.



Slika 2. U sjedećem ili ležećem položaju, nagnite glavu unatrag i laganim stiskanjem bočice ukapajte jednu kap u donju konjunktivalnu vrećicu oka. Pogledajte prema dolje i lagano zatvorite oko 1 do 2 minute. Blagim pritiskom prsta na kut oka kod nosa možete smanjiti otjecanje lijeka iz oka. Pokušajte ne treptati i nemojte trljati oko. Vratite zatvarač na bočicu i dobro je zatvorite.

Prije upotrebe kapi operite ruke. Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za oko smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati oko kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj.

Upalne bolesti oka

Djeca mlađa od 12 godina ukapavaju 1 kap 0,5% otopine u bolesno oko/oči do 3 puta dnevno.
Djeca starija od 12 godina i odrasli ukapavaju 1 kap 0,5% ili 1% otopine u bolesno oko/oči do 4 puta dnevno

Kod refrakcije oka

Djeca mlađa od 12 godina ukapavaju 1 kap 0,5% otopine u bolesno oko/oči 1-3 dana prije pregleda.
Djeca starija od 12 godina i odrasli ukapavaju 1 kap 1% otopine u bolesno oko/oči 2 puta dnevno 1-2 dana prije pregleda ili 1-2 kapi 1% otopine 1 sat prije pregleda.

Ako primijenite više Atropin kapi za oko nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za oko od propisane obilno isperite oko vodom i obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Atropin kapi za oko

Atropin je lijek koji može biti štetan ako se proguta. U slučaju predoziranja ili gutanja lijeka, posebno kod djece, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Atropin kapi za oko i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Atropin kapi za oko

Ako ste zaboravili upotrijebiti Atropin kapi za oko kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Atropin kapi za oko kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ATROPIN KAPI ZA OKO

Poput svih lijekova, Atropin kapi za oko mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon ukapavanja Atropin za oko vrlo rijetko se može pojaviti reakcija preosjetljivosti sa simptomima osipa te crvenih, otečenih ili vodenastih očiju.

Vrlo rijetko može doći do povećane osjetljivosti na svjetlost (fotofobija), suhih usta, otežanog gutanja, crvenila i suhe kože, usporenog rada srca (bradikardija), ubrzanog rada srca (tahikardija), palpitacija, poremećaja srčanog ritma (aritmija), naгона za mokrenjem, nemogućnosti mokrenja, zatvora, mučnine, povraćanja, nemira, nervoze, halucinacija i nekontroliranih pokreta.

Dugotrajnom primjenom Atropin kapi za oko može doći do lokalne iritacije, peckanja, crvenih očiju, oticanja očnih kapaka i povišenog očnog tlaka.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Atropin kapi za oko i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI ATROPIN KAPI ZA OKO

Atropin za oko čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju.
Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!
Atropin kapi za oko se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.
Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 30 dana.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Atropin kapi za oko i sadržaj pakiranja

Atropin kapi za oko su bistra, bezbojna otopina. 10 g otopine u u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g otopine Atropin 0,5% kapi za oko sadržava 5 mg atropinsulfata
1 g otopine Atropin 1% kapi za oko sadržava 10 mg atropinsulfata

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev klorid; benzalkonijev klorid

Način izdavanja

Atropin kapi za oko dostupne su na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

01007/1