

Benzilbenzoat mazilo, emulzija za kožu — 150 mL

250 mg/g ————— benzilbenzoat

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Benzilbenzoat mazilo i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo
3. Kako upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo
4. Koji su neželjeni učinci Benzilbenzoat mazila
5. Kako čuvati Benzilbenzoat mazilo
6. Dodatne informacije

ŠTO JE BENZILBENZOAT MAZILLO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Benzilbenzoat mazilo sadržava djelatnu tvar benzilbenzoat. Benzilbenzoat se upotrebljava za lokalno liječenje svraba (scabies) i ušljivosti tijela (pedikuloza).

Svrab je infestacija kože grinjom (*Sarcoptes scabiei*), ljudskim parazitom koji se ukopava ispod površine kože te tako dovodi do razvoja simptoma. Glavni simptom bolesti je intenzivan svrbež (naročito noću) uz lokalno crvenilo (eritem) koje se pojavljuje na mjestima svrbeža.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI BENZILBENZOAT MAZILLO

Nemojte upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- na licu, sluznicama te oko očiju
- na oštećenju koži, koži s osipom, ranama i opekotinama

Budite oprezni s Benzilbenzoat mazilom

Benzilbenzoat mazilo služi samo za vanjsku upotrebu. Nakon upotrebe mazila operite ruke. Treba paziti da Benzilbenzoat mazilo ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Benzilbenzoat mazilo se kod djece može upotrebljavati samo pod liječničkim nadzorom. Upotreba kod dojenčadi starije od 2 mjeseca i kod djece mlađe od 2 godine se preporučuje samo u slučaju opravdane potrebe, koju utvrđuje liječnik.

Ako se ipak koristi, Benzilbenzoat mazilo je potrebno razrijediti vodom u omjeru 1:1 (1 dio Benzilbenzoat mazila, 1 dio vode) za upotrebu kod djece od 2 do 12 godina, odnosno u omjeru 1:3 (1 dio Benzilbenzoat mazila, 3 dijela vode) za upotrebu kod dojenčadi starije od 2 mjeseca i kod djece mlađe od 2 godine. Ljekarnik Vam može pomoći razrijediti Benzilbenzoat mazilo.

Upotreba Benzilbenzoat mazila s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Benzilbenzoat mazila

Benzilbenzoat mazilo sadrži:

- metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
- Mogu uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

- cetilni i stearyl alkohol
- Može uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

KAKO UPOTREBLJAVATI BENZILBENZOAT MAZILLO

Benzilbenzoat mazilo uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Prije upotrebe Benzilbenzoat mazilo treba dobro promućkati.

Najprije Benzilbenzoat mazilo nanesite na mali dio kože. Nakon 10 minuta provjerite reakciju kože, ako nema pojačanog nadražaja kože nastavite s upotrebom.

Svrab

Prije lokalne upotrebe Benzilbenzoat mazila treba se okupati u toploj vodi i sapunu te istrljati kožu radi uklanjanja oroženih područja kože. Zatim mazilo treba ravnomjerno i nježno nanijeti vatom na suhu kožu cijelog tijela, od vrata prema stopalima, uključujući i tabane. Benzilbenzoat mazilo treba ostaviti 24 sata i nakon toga ponovno se okupati u toploj vodi. Preporučuje se još jednom unutar 5 dana nanijeti Benzilbenzoat mazilo po istom postupku. Ponekad jedna upotreba može biti dovoljna, ako ste temeljito nanijeli benzilbenzoat mazilo. Posteljinu, donje rublje i ručnike je poželjno svakodnevno mijenjati i prati na 90°C. Odjeću koja se ne smije prati na tako visokoj temperaturi nemojte koristiti tijekom liječenja.

Ušljivost tijela

Nanesite benzilbenzoat mazilo na zahvaćeno područje te nakon 24 sata isperite sapunom i vodom. Postupak možete ponoviti nakon 7 dana, ako je potrebno. Kod težih slučajeva može biti potrebno ponoviti postupak 2 do 3 puta.

Ako primijenite više Benzilbenzoat mazila nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu mazila od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Benzilbenzoat mazila

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Benzilbenzoat mazilo i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Benzilbenzoat mazilo

Ako ste zaboravili upotrijebiti Benzilbenzoat mazilo kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI BENZILBENZOAT MAZILA

Poput svih lijekova, Benzilbenzoat mazilo može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Benzilbenzoat mazila može doći do pojave svrbeža, suhoće kože, crvenila, osjećaja žarenja i peckanja, pogotovo na genitalnoj regiji i sluznicama. Učestala upotreba može izazvati kontaktni dermatitis. U bolesnika sa svrabom svrbež može potrajati i nekoliko tjedana nakon prestanka upotrebe mazila.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Benzilbenzoat mazilo i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI BENZILBENZOAT MAZILO

Benzilbenzoat mazilo čuvajte dobro zatvoreno, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Benzilbenzoat mazilo se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Benzilbenzoat mazila i sadržaj pakiranja

Benzilbenzoat mazilo je bijela emulzija karakterističnog mirisa. 150 mL mazila u staklenoj bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g emulzije sadržava 250 mg benzilbenzoata

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; cetilni i stearylni alkohol; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat

Način izdavanja

Benzilbenzoat mazilo je dostupno na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

01931/1