

Betametazon krema — 30 g, 100 g

0,1 mg/g	_____	betametazon
0,2 mg/g	_____	betametazon
0,3 mg/g	_____	betametazon

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Betametazon krema i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Betametazon kremu
3. Kako upotrebljavati Betametazon kremu
4. Koji su neželjeni učinci Betametazon kreme
5. Kako čuvati Betametazon kremu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE BETAMETAZON KREMA I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Betametazon krema sadrži djelatnu tvar betametazon u obliku betametazon dipropionata. Betametazon je topikalni kortikosteroid koji se koristi kod svrbeža i crvenila uzrokovanih ekcemom, dermatitisom (upala kože) te psorijazom dlanova, stopala i vlasišta.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI BETAMETAZON KREMU

Nemojte upotrebljavati Betametazon kremu:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod ostalih kožnih bolesti, posebice ako se radi o rozaceji, aknama, dermatitisu u području oko usta, svrbežu spolovila i anusa, pelenskom osipu, oralnom herpesu (HSV), vodenim kozicama, herpes zosteru ili drugi bolestima kože

Budite oprezni s Betametazon kremom

Ne preporučuje se korištenje Betametazon kreme u djece mlađe od 12 godina bez nadzora. Primjena Betametazon kreme u djece mora biti provedena uz oprez i tijekom najkraćeg mogućeg vremena potrebnog da se ostvari učinak. U djece se ne preporuča korištenje dulje od 5 dana. Betametazon krema služi samo za vanjsku upotrebu. Ne smije se nanositi na lice. Nakon upotrebe kreme operite ruke. Kod prekomjernog korištenja može doći do stanjivanja kože te nastanka crvenih mrlja. Betametazon kremu ne primjenjujte ispod zavoja ili flastera. Treba paziti da Betametazon krema ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Betametazon kreme s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte istovremeno upotrebljavati druge pripreve sa sličnim djelovanjem na istom području.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Betametazon kremu bez da je liječnik procijenio da je korist za majku veća negoli rizik za plod. Ovaj pripravak se ne smije primjenjivati na dojka prije dojenja.

Važne informacije o nekim sastojcima Betametazon kreme

Betametazon krema sadrži:

- cetilni alkohol
- Može uzrokovati alergijsku reakciju (kontaktni dermatitis).

- propilenglikol
- Betametazon krema sadrži 85 mg propilenglikola po 1 g kreme. Propilenglikol može uzrokovati iritacije kože.

KAKO UPOTREBLJAVATI BETAMETAZON KREMU

Betametazon kremu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Betametazon kremu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Betametazon kremu nanosite u tankom sloju, 1 do 2 puta na dan i ne dulje od 14 dana. Na licu ju nemojte koristiti dulje od 5 dana.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 14 dana, potrebno je prekinuti primjenu kreme i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Betametazon kreme nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kreme od propisane odstranite višak papirnatom maramicom. Koristite li kremu dulje od preporučenog razdoblja ili na velikim površinama kože mogu se javiti mučnina, povraćanje i tinitus (zvonjenje u ušima). Također, dulja upotreba može imati utjecaja na neke hormone te se odraziti na djetetov rast i razvoj.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Betametazon kreme

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, zatražite liječničku pomoć i ponesite Betametazon kremu i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Betametazon kremu

Ako ste zaboravili upotrijebiti Betametazon kremu kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati Betametazon kremu

Ako ste primjenjivali kremu tijekom duljeg razdoblja te se kožne promjene povlače, nemojte iznenada prestati s primjenom ove kreme. Ponekad pri naglom prestanku liječenja može doći do pojave crvenila te osjećaja bockanja i žarenja. Kako biste to izbjegli, savjetujte se sa svojim liječnikom koji će postupno smanjivati terapiju sve do potpunog prekida.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI BETAMETAZON KREME

Poput svih lijekova, Betametazon krema može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Betametazon kreme često može doći do pojave peckanja, svrbeža, nadraženosti, suhoće kože na mjestu primjene, upale korijena dlake (folikulitis), prekomjernog rasta dlaka (hipertrichoza), promjena na koži sličnim aknama (akneiformne erupcije), smanjene pigmentacije kože, proširenih krvnih žila kože i sluznica (teleangiektazija), crvenila i upale oko usta (perioralni dermatitis), crvenila, otekлина i mjehurića na koži (alergijski kontaktni dermatitis), upale i vlažnost kože (maceracija kože), infekcije koja nastaje tijekom ili nakon liječenja neke druge infekcije (sekundarna infekcija), nastanka strija, stanjivana kože te poremećaja žlijezda znojnica (milijarija). Rijetko može doći do smanjene funkcije nadbubrežne žlijezde. Nepoznatom učestalošću može doći i do zamućenja vida. Nuspojave se lakše mogu javiti u dojenčadi i djece. Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Betametazon kremu i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI BETAMETAZON KREMU

Betametazon kremu čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju. Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Betametazon krema se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Betametazon kreme i sadržaj pakiranja

Betametazon krema bijele je boje, bez mirisa. Dolazi u pakiranju od 30 ili 100 grama kreme u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g kreme Betametazon krema 0,1 mg/g sadržava 0,1 mg betametazona u obliku betametazondipropionata

1 g kreme Betametazon krema 0,2 mg/g sadržava 0,2 mg betametazona u obliku betametazondipropionata

1 g kreme Betametazon krema 0,3 mg/g sadržava 0,3 mg betametazona u obliku betametazondipropionata

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; vazelin, bijeli; trigliceridi, srednje duljine lanca; propilenglikol; makrogol[20]glicerolmonostearat; cetilni alkohol; glicerolmonostearat 40–55; natrijev citrat; citratna kiselina

Način izdavanja

Betametazon krema dostupna je na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko–dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03479/2