

Borvazelin mast — 25 g

30 mg/g — boratna kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Borvazelin mast i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Borvazelin mast
3. Kako upotrebljavati Borvazelin mast
4. Koji su neželjeni učinci Borvazelin masti
5. Kako čuvati Borvazelin mast
6. Dodatne informacije

ŠTO JE BORVAZELIN MAST I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Borvazelin mast sadržava djelatnu tvar boratnu kiselinu. Djeluje kao antiseptik i antifungik, smiruje upalne procese te sprječava razvoj kožnih infekcija. Borvazelin mast upotrebljava se kod kožnih iritacija, manjih posjekotina i opekotina te uboda insekata.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI BORVAZELIN MAST

Nemojte upotrebljavati Borvazelin mast:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivost–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod djece mlađe od 12 godina
- na oštećenoj koži
- na velikim površinama kože
- na sluznicama oka, usta i nosa

Upotreba Borvazelin masti s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Borvazelin mast tijekom trudnoće ili dojenja.

Važne informacije o nekim sastojcima Borvazelin masti

Borvazelin mast sadrži:

- boratnu kiselinu

Nemojte upotrebljavati kod djece mlađe od 12 godina jer ovaj lijek sadrži bor i može umanjiti plodnost.

KAKO UPOTREBLJAVATI BORVAZELIN MAST

Borvazelin mast uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Borvazelin mast posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Prije upotrebe isprobajte mast na maloj površini kože.

Borvazelin mast uvijek nanosite na čistu i suhu kožu. Mast se nanosi u tankom sloju 1 do 3 puta dnevno.

Ako primijenite više Borvazelin masti nego što ste trebali

Obrišite suvišak masti, npr. upijajućim papirom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Borvazelin masti

U slučaju gutanja, posebno kod male djece, odmah zatražite liječničku pomoć i ponesite Borvazelin mast i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Borvazelin mast

Ako ste zaboravili upotrijebiti Borvazelin mast kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI BORVAZELIN MASTI

Poput svih lijekova, Borvazelin mast može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Prestanite s upotrebom Borvazelin masti i javite se liječniku ako vam se nakon primjene masti pojavi kožni osip, iritacija kože i sluznica te edemi.

Prilikom upotrebe može se pojaviti i crvenilo ili osjećaj žarenja na koži.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Borvazelin mast i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI BORVAZELIN MAST

Borvazelin mast čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju. Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Borvazelin mast se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripreme koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Borvazelin masti i sadržaj pakiranja

Borvazelin mast je mast bijele boje. Pakirana je u aluminijsku tubu s navojnim zatvaračem. Dolazi u pakiranju od 25 grama masti, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g masti sadržava 30 mg boratne kiseline

Pomoćne tvari: vazelin, bijeli; glicerol

Način izdavanja

Borvazelin mast dostupna je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00976/1