

Čaj protiv nadutosti i otežane probave — 80 g

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu. Možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Čaj protiv nadutosti i otežane probave i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Čaj protiv nadutosti i otežane probave
3. Kako upotrebljavati Čaj protiv nadutosti i otežane probave
4. Koji su neželjeni učinci Čaja protiv nadutosti i otežane probave
5. Kako čuvati Čaj protiv nadutosti i otežane probave
6. Dodatne informacije

ŠTO JE ČAJ PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE I ZA ŠTO SE UPOTREBLJIVA

Čaj protiv nadutosti i otežane probave je galenski pripravak, koji se sastoji od osušenih plodova aniša, kima i slatkog komorača te osušenog cvijeta kamilice.

Čajna mješavina se upotrebljava za simptomatsko liječenje funkcionalnih i motilitetom uvjetovanih probavnih smetnji. Aniš, kim i komorač su karminativi i stomahici, stoga olakšavaju tegobe vezane uz nadutost i flatulenciju (meteorizam). Zahvaljujući spazmolitičkom djelovanju, čajna mješavina pomaže ublažavanju grčeva probavnog trakta.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ČAJ PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE

Nemojte upotrebljavati Čaj protiv nadutosti i otežane probave ako:

- ako ste preosjetljivi-alergični na neki od sastojaka čaja.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako imate neke od bolesti jetre, kolangitis, žučne kamence ili druge bolesti žuč

Budite oprezni s Čajem protiv nadutosti i otežane probave

Ako se pojave visoka temperatura, grčevi ili krv u urinu, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Ne preporučuje se upotreba čaja kod djece mlađe od 12 godina.

Upotreba Čaja protiv nadutosti i otežane probave s drugim lijekovima

Nema kliničkih istraživanja koje bi potvrdile interakcije s drugim lijekovima. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Upotreba Čaja protiv nadutosti i otežane probave tijekom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

KAKO UPOTREBLJAVATI ČAJ PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE

Čaj protiv nadutosti i otežane probave uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Čaj protiv nadutosti i otežane probave posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

1 žlicu čajne mješavine prelijte s 2 dL vruće vode i poklopite. Procijedite nakon 15 minuta.

Preporučuje se piti do dvije šalice čaja dnevno. Piti svježe pripremljeni čaj.

Ako ne dođe do poboljšanja simptoma nakon 2 tjedna ili se pak simptomi pogoršaju, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste upotrijebili više Čaja protiv nadutosti i otežane probave nego što ste trebali

Prekomjerna upotreba čaja može dovesti do gubitka tekućine. Ako se to dogodi potrebno je prekinuti upotrebu čaja i javiti se liječniku radi nadoknade tekućine i elektrolita.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ČAJA PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE

Poput svih lijekova, Čaj protiv nadutosti i otežane probave može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Može doći do reakcije preosjetljivosti (svrbež, osip, crvenilo) te do smetnji respiratornog sustava. Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

KAKO ČUVATI ČAJ PROTIV NADUTOSTI I OTEŽANE PROBAVE

Čaj protiv nadutosti i otežane probave čuvati na suhom mjestu.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Čaj protiv nadutosti i otežane probave se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Čaja protiv nadutosti i otežane probave i sadržaj pakiranja

Mješavina osušenih plodova kima, aniša i komorača te osušenih cvjetova kamilice. 80 g čaja u polipropilenskoj vrećici, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g Čaja protiv nadutosti i otežane probave sadrži 0,25 g aniševog ploda (*Pimpinella anisum* L., fructus), 0,25 g kimovog ploda (*Carum carvi* L., fructus), 0,25 g ploda slatkog komorača (*Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *vulgare* var. *dulce* (Mill.) Batt. & Trab.) i 0,25 g kamiličinog cvijeta (*Matricaria recutita* L., flos)

Način izdavanja

Čaj protiv nadutosti i otežane probave izdaje se bez liječničkog recepta, u ljekarnama

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02447/1