

Difengal sprej za kožu, otopina — 100 mL

20 mg/mL — difenhidraminklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Difengal sprej za kožu i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Difengal sprej za kožu
3. Kako upotrebljavati Difengal sprej za kožu
4. Koji su neželjeni učinci Difengal spreja za kožu
5. Kako čuvati Difengal sprej za kožu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE DIFENGAL SPREJ ZA KOŽU I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Difengal sprej za kožu sadržava difenhidraminklorid, djelatnu tvar iz skupine antihistaminika. Upotrebljava se za ublažavanje svrbeža i iritacija kože povezanih s osipom, koprivnjačom (urtikarijom), blagim opeklinama od sunca te ugrizom ili ubodom insekata.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI DIFENGAL SPREJ ZA KOŽU

Nemojte upotrebljavati Difengal sprej za kožu:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod djece mlađe od 2 godine
- ako imate ekcem (dermatitis)
- ako imate vodene kozice (varičele) ili ospice
- na oštećenoj koži
- na velikim površinama kože
- na sluznicama oka, usta i nosa

Budite oprezni s Difengal sprejem za kožu

Difengal sprej za kožu služi samo za vanjsku upotrebu. Nakon upotrebe otopine operite ruke. Treba paziti da Difengal sprej za kožu ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenim.

Upotreba Difengal spreja za kožu s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte upotrebljavati Difengal sprej za kožu istovremeno s drugim lijekovima koji sadržavaju difenhidraminklorid.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Difengal sprej za kožu tijekom trudnoće ili dojenja bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Difengal spreja za kožu

Difengal sprej za kožu sadrži:

- trometamol

Može uzrokovati lokalne iritacije kože (npr. kontaktni dermatitis).

- etanol

Ovaj lijek sadrži 150 mg alkohola (etanola) po 1 g otopine.

Može izazvati osjećaj peckanja na oštećenoj koži. Može iritirati kožu.

Učinci alkohola pojačani su u novorođenčadi i dojenčadi (mlađe od 2 godine) u usporedbi sa starijom djecom i odraslima zbog bolje apsorpcije kroz kožu. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što date ovaj lijek svojoj bebi.

KAKO UPOTREBLJAVATI DIFENGAL SPREJ ZA KOŽU

Difengal sprej za kožu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Difengal sprej za kožu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Na zahvaćeno područje kože nanosite Difengal sprej za kožu, ne više od 4 puta dnevno. Nakon upotrebe operite ruke. Ako se simptomi uz upotrebu Difengal spreja za kožu ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Difengal spreja za kožu

U slučaju gutanja, posebno kod male djece, obilno isperite usnu šuplinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Difengal sprej za kožu i ovu uputu sa sobom.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI DIFENGAL SPREJA ZA KOŽU

Poput svih lijekova, Difengal sprej za kožu može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti, fotoosjetljivosti (osjetljivost kože pri izlaganju suncu) te do ekcema.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI DIFENGAL SPREJ ZA KOŽU

Difengal sprej za kožu čuvajte dobro zatvoren, u originalnom pakiranju.
Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!
Difengal sprej za kožu se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.
Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Difengal spreja i sadržaj pakiranja

Difengal sprej za kožu je bistra, bezbojna do blago žuta otopina. 100 mL otopine u plastičnoj (HDPE) s plastičnim (HDPE) nastavkom za raspršivanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine sadržava 20 mg difenhidraminklorida.

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; etanol, 96 postotni; glicerol; alojev tekući ekstrakt; trometamol

Način izdavanja

Difengal sprej za kožu dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03253/1