

Diklofenak plus emulgel — 50 g/100 g

20 mg/g _____ diklofenaknatrij
50 mg/g _____ levomentol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Diklofenak plus emulgel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Diklofenak plus emulgel
3. Kako upotrebljavati Diklofenak plus emulgel
4. Koji su neželjeni učinci Diklofenak plus emulgela
5. Kako čuvati Diklofenak plus emulgel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE DIKLOFENAK PLUS EMULGEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Diklofenak plus emulgel sadržava diklofenakdietilamin, djelatnu tvar iz skupine lijekova zvanih nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) te djelatnu tvar levomentol koji hladi i ublažava bol. Diklofenak plus emulgel se primjenjuje za liječenje boli, smanjenje upale i oticanja kod bolnih stanja koja zahvaćaju mišiće i zglobove. Namijenjen za kratkotrajno lokalno simptomatsko liječenje akutne boli, upale i oticanja kod ozljeda mekih tkiva, kao što su posttraumatske upale tetiva, ligamenata, mišića i zglobova uzrokovanih primjerice akutnim prenaprezanjem, uganućem i podljevima (sportske ozljede).

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI DIKLOFENAK PLUS EMULGEL

Nemojte upotrebljavati Diklofenak plus emulgel:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi-alergični na druge lijekove iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova, kao što je primjerice ibuprofen
 - kod djece i adolescenata mlađih od 14 godina
 - ako imate ekcem (dermatitis)
 - ako imate veći rizik od napada astme, lokalnog oticanja kože ili sluznice ili koprivnjače
 - na oštećenoj koži
 - na velikim površinama kože
 - na sluznicama oka, usta i nosa

Budite oprezni s Diklofenak plus emulgelom

Treba paziti da Diklofenak plus emulgel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima. Nemojte primjenjivati emulgel ispod nepropusnih (plastičnih) zavoja, ali mogu se koristiti ortoze ili zavoji koji se obično primjenjuju kod ozljeda poput iščašenja. Tijekom korištenja Diklofenak plus emulgela koža može biti osjetljivija na sunce, stoga izbjegavajte sunčanje i odlazak u solarij.

Upotreba Diklofenak plus emulgela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte upotrebljavati Diklofenak plus emulgel istovremeno s drugim lijekovima koji sadržavaju diklofenak.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Diklofenak plus emulgel tijekom trudnoće ili dojenja bez preporuke liječnika. Ne postoji dovoljno informacija o izlučivanju levomentola u majčino mlijeko, zbog čega se korištenje ovog lijeka ne preporučuje tijekom dojenja. Diklofenak plus emulgel se ne smije koristiti tijekom posljednjeg tromjesečja (zadnja tri mjeseca) trudnoće jer to može naškoditi Vašem nerođenom djetetu ili uzrokovati probleme pri porodu. Diklofenak plus emulgel se smije koristiti tijekom prvog i drugog tromjesečja (prvih šest mjeseci) trudnoće samo po preporuci liječnika. U tom slučaju doza mora biti što je moguće niža, a vrijeme uporabe što je moguće kraće.

Važne informacije o nekim sastojcima Diklofenak plus emulgela

Diklofenak plus emulgel sadrži:

- propilenglikol koji može nadražiti kožu

Budući da ovaj lijek sadrži propilenglikol, nemojte ga primjenjivati na otvorenim ranama ili velikim područjima rascupale ili oštećene kože (poput opekline) bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.

Diklofenak plus emulgel sadrži 50 mg/g propilenglikola.

- butilhidroksitoluen

Može uzrokovati lokalnu reakciju kože (npr. kontaktni dermatitis) ili iritaciju oka i sluznica.

- cetilni alkohol

Može uzrokovati lokalnu reakciju kože (npr. kontaktni dermatitis).

KAKO UPOTREBLJAVATI DIKLOFENAK PLUS EMULGEL

Diklofenak plus emulgel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Diklofenak plus emulgel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Na bolno područje Diklofenak plus emulgel primjenjuje se utrljavanjem na kožu 2 puta na dan (najbolje ujutro i navečer). Analgetski učinak lijeka može trajati do 12 sati nakon jedne doze. Ovisno o veličini zahvaćenog područja koje treba liječiti, potrebno je 2 do 4 g emulgela, što je količina koja odgovara veličini trešnje do oraha. Najveća dnevna doza je 8 g emulgela. Nakon upotrebe operite ruke.

Ako se simptomi uz upotrebu Diklofenak plus emulgela kod djece od 14 do 18 godina pogoršaju ili se ne ublaže tijekom 7 dana upotrebe, potrebno se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Odrasli (18 godina i stariji) Diklofenak plus emulgel mogu koristiti 2 tjedna kod ozljede mišića i zglobova ili kod tendinitisa. Za artritičnu bol mogu ga upotrebljavati 3 tjedna. Liječnik može preporučiti i dulje liječenje.

Ako se bol i oticanje ne poboljšaju u roku od 7 dana ili se pogoršaju, obavezno se obratite liječniku.

Ako primijenite više lijeka Diklofenak plus emulgela nego što ste trebali

Obrišite suvišak emulgela, npr. upijajućim papirom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Diklofenak plus emulgela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Diklofenak plus emulgel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Diklofenak plus emulgel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Diklofenak plus emulgel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte nanositi dvostruku količinu Diklofenak plus emulgela kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI DIKLOFENAK PLUS EMULGELA

Poput svih lijekova, Diklofenak emulgel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti, kožnog osipa s mjehurićima ili koprivnjače te opekлина od sunca.

Zviždanje u plućima pri disanju, pritisak u prsima, nedostatak zraka, oticanje lica, usana, jezika ili grla također se pojavljuju vrlo rijetko.

Manje česte nuspojave su perutanje, dehidracija i oticanje kože.

Česte nuspojave su dermatitis, kožni osip, svrbež, crvenilo ili oštra površinska bol kože. Reakcije kože na mjestu primjene obično su prolazne i blage, međutim ako ste zabrinuti obratite se vašem liječniku ili ljekarniku.

Ako se Diklofenak plus emulgel primjenjuje na većoj površini dulje vrijeme, ne može se isključiti mogućnost sistemskih nuspojava (sistemske reakcije preosjetljivosti, bubrežne, jetrene ili probavne nuspojave).

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Diklofenak plus emulgel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI DIKLOFENAK PLUS EMULGEL

Diklofenak plus emulgel čuvajte dobro zatvorenim, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Diklofenak plus emulgel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Diklofenak plus emulgela i sadržaj pakiranja

Diklofenak plus emulgel bijele je boje, mirisa na mentol. Pakiran je u aluminijsku tubu s navojnim zatvaračem. Dolazi u pakiranju od 50 i 100 grama emulgela, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 23,2 mg djelatne tvari diklofenakdietilamina (što odgovara 20 mg diklofenaknatrija) i 50 mg djelatne tvari levomentola

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; izopropilni alkohol; parafin, tekući; propilenglikol; sorbitanstearat; kokoilkaprilokaprat; cetilni alkohol; glicerolmonostearat, makrogol[100]glicerolmonostearat; karbomeri; butilhidroksitoluen; natrijev hidroksid

Način izdavanja

Diklofenak plus emulgel dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03422/1