

Efedrin kapi za nos, otopina 0,25%, 0,5%, 1% ——— 10 g

2,5 mg/g	_____	efedrinklorid
5 mg/g	_____	efedrinklorid
10 mg/g	_____	efedrinklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Efedrin kapi za nos i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Efedrin kapi za nos
3. Kako upotrebljavati Efedrin kapi za nos
4. Koji su neželjeni učinci Efedrin kapi za nos
5. Kako čuvati Efedrin kapi za nos
6. Dodatne informacije

ŠTO SU EFEDRIN KAPI ZA NOS I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Djelatna tvar u Efedrin kapima za nos je efedrinklorid. Efedrinklorid je simpatomimetik koji smanjuje otečenost sluznice stezanjem krvnih kapilara u sluznici nosa. Smanjena otečenost sluznice dovodi do manje začepljenosti nosa, olakšanog istjecanja sekreta i nesmetanog disanja. Efedrin kapi za nos upotrebljavaju se za simptomatsko liječenje rinitisa i sinusitisa.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI EFEDRIN KAPI ZA NOS

Nemojte upotrebljavati Efedrin kapi za nos ako:

- ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- imate glaukom zatvorenog kuta

Budite oprezni s Efedrin kapima za nos:

- ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitori) ili druge lijekove koji mogu povišiti arterijski krvni tlak
- ako imate povišen očni tlak, osobito glaukom uskog kuta
- ako imate tešku kardiovaskularnu bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija)
- ako imate metaboličke poremećaje (hipertireoza, dijabetes, porfirija)
- ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- ako imate povećanu prostatu
- kod stanja nakon transsfenoidalne operacije hipofize ili nekog drugog zahvata tijekom kojeg je izložena tvrda moždana ovojnica

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Efedrin kapi za nos.

Upotreba Efedrin kapi za nos s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Istovremena upotreba Efedrin kapi za nos s određenim lijekovima za depresiju (triciklički antidepresivi ili MAO inhibitori), kao i s lijekovima za sniženje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), može dovesti do porasta krvnog tlaka. Istodobna upotreba Efedrin kapi za nos sa srčanim glikozidima (digoksinom) može povećati rizik nastanka nepravilnosti u srčanom ritmu. Uzimanje Efedrin kapi za nos s lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. bromokriptin) može dovesti do aditivne kardiovaskularne toksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Efedrin kapi za nos bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Efedrin kapi za nos

Efedrin kapi za nos sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 g otopine. Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj ili oticanje sluznice u nosu, osobito kada se koristi duže vrijeme. Dugotrajna primjena može uzrokovati edem sluznice nosa.


KAKO UPOTREBLJAVATI EFEDRIN KAPI ZA NOS

Efedrin kapi za nos uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Efedrin kapi za nos posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:

DOB	EFEDRIN kapi za nos	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Dojenčad i djeca do 2 godine	0,25%	1 kap	do 3 puta 1 kap
2-7 godina	0,25%	1 kap	do 4 puta 1 kap
7-14 godina	0,5%	1 kap	do 4 puta 1 kap
Djeca starija od 14 godina i odrasli	1%	1-2 kapi	do 4 puta 1-2 kapi

Način upotrebe

Dojenčadi i djeci do 2 godine vatiranim štapićem lagano očistite nos. Pola sata prije hranjenja i pred spavanje, u sjedećem ili ležećem položaju s glavom zabačenom unatrag, ukapajte 1 kap do 3 puta dnevno.



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj.

Slika 2. Prije upotrebe Efedrin kapi, lagano ispušite nos. U sjedećem ili ležećem položaju, s glavom zabačenom unatrag, ukapajte 1 do 2 kapi u obje nosnice prema potrebi, ali ne više od 4 puta na dan. Držite glavu u istom položaju još nekoliko minuta kako bi se olakšao prolaz kapi kroz nos.

Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za nos smije koristiti samo jedna osoba. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj. Nemojte koristiti Efedrin kapi za nos češće nego li je preporučeno niti duže od 7 dana. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno je prekinuti primjenu kapi i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Efedrin kapi za nos nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za nos od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja su nemir, agitacija, širenje zjenica (midrijaza), podrhtavanje ruku, bljedilo kože, mučnina, povraćanje, pospanost, glavobolja, povišen krvni tlak (hipertenzija), ubrzan rad srca (tahikardija). Unos jako velike količine Efedrin kapi za nos može uzrokovati snižen krvni tlak (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), pad tjelesne temperature (hipotermija) i prestanak disanja (apneja). Kod djece, posebno mlađe od 1 godine, može doći i do poremećaja svijesti te kome.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Efedrin kapi za nos

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Efedrin kapi za nos i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Efedrin kapi za nos

Ako ste zaboravili upotrijebiti Efedrin kapi za nos kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Efedrin kapi za nos kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI EFEDRIN KAPI ZA NOS

Poput svih lijekova, Efedrin kapi za nos mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Efedrin kapi za nos mogu izazvati lokalni nadražaj sluznice praćen lokalnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće. Mogu izazvati i neke sistemske nuspojave kao što su glavobolja, omaglica, poremećaj svijesti, povišen krvni tlak (hipertenzija), palpitacije, ubrzan rad srca (tahikardija), nemir, umor, mučnina, slabost, pad tjelesne temperature (hipotermija). U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Efedrin kapi za nos. Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Efedrin kapi za nos i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI EFEDRIN KAPI ZA NOS

Efedrin kapi za nos čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju. Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Efedrin kapi za nos se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 2 mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripreve koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Efedrin kapi za nos i sadržaj pakiranja

Efedrin kapi za nos su bistra, bezbojna otopina. 10 g otopine u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

- 1 g otopine Efedrin 0,25% kapi za nos sadržava 2,5 mg efedrinsklorida
- 1 g otopine Efedrin 0,5% kapi za nos sadržava 5 mg efedrinsklorida
- 1 g otopine Efedrin 1% kapi za nos sadržava 10 mg efedrinsklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev klorid; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; natrijev hidrogenfosfat dihidrat; benzalkonijev klorid

Način izdavanja

Efedrin kapi za nos se izdaju na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00987/1