

Eritromicin, otopina za kožu ——— 100 mL

20 mg/g

eritromicin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Eritromicin otopina i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Eritromicin otopinu
3. Kako upotrebljavati Eritromicin otopinu
4. Koji su neželjeni učinci Eritromicin otopine
5. Kako čuvati Eritromicin otopinu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE ERITROMICIN OTOPINA I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Eritromicin otopina se upotrebljava za lokalno liječenje akni, posebno upalnih vrsta papula i pustula. Koristi se u liječenju blagih i umjerenih akni. Eritromicin je antibiotik koji zaustavlja rast bakterija.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ERITROMICIN OTOPINU

Nemojte upotrebljavati Eritromicin otopinu ako:

- ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ste preosjetljivi–alergični na eritromicin ili na neki drugi antibiotik iz skupine makrolida
- bolujete od upalnih bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Chronova bolest) ili ste nekada imali upalu crijeva povezanu s primjenom antibiotika

Budite oprezni s Eritromicin otopinom

Izbjegavajte upotrebu Eritromicin otopine na očima, ustima ili na oštećenoj koži. Ako otopina dospije na navedene dijelove, dobro ih isperite hladnom vodom.

Lokalna upotreba eritromicina može uzrokovati rast neosjetljivih (rezistentnih) mikroorganizama. Ako se pojavi dodatna infekcija tijekom upotrebe Eritromicin otopine odmah prestanite s upotrebom i obavijestite svog liječnika.

Budite posebno oprezni ako imate upalnu bolest crijeva ili ste imali kolitis povezan s upotrebom antibiotika. Ako se pojave simptomi poput dugotrajnog ili krvavog proljeva, tijekom ili nakon upotrebe Eritromicin otopine, prekinite s upotrebom te obavijestite svog liječnika. Ovo može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koja se može javiti nakon upotrebe antibiotika. Ne izlažite se otvorenom plamenu dok se pripravak potpuno ne osuši na koži.

Upotreba Eritromicin otopine s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, čak i ako su to lijekovi bez recepta. Ne preporučuje se istodobna upotreba Eritromicin otopine s drugim preparatima za liječenje akni koji sadržavaju klindamicin. Nemojte istovremeno s Eritromicin otopinom upotrebljavati druge pripreme za liječenje akni bez preporuke liječnika ili ljekarnika.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Eritromicin otopinu tijekom trudnoće ili dojenja bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Eritromicin otopine

Eritromicin otopina sadrži:

- etanol

Ovaj lijek sadrži 677 mg alkohola (etanol, bezvodni) po 1 mL otopine.
Može izazvati osjećaj peckanja na oštećenoj koži. Može iritirati kožu.

Učinci alkohola pojačani su u novorođenčadi i dojenčadi (mlađe od 2 godine) u usporedbi sa starijom djecom i odraslima zbog bolje apsorpcije kroz kožu. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što date ovaj lijek svojoj bebi.

KAKO UPOTREBLJAVATI ERITROMICIN OTOPINU

Eritromicin otopinu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Eritromicin otopinu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Očistite kožu zahvaćenog područja prije upotrebe Eritromicin otopine. Eritromicin otopinu nanesite 2 puta dnevno na zahvaćeno područje tako da potrebnu količinu otopine nanesete na vatru i utapkate po koži.

Maksimalno poboljšanje najčešće nastupa za oko 6–8 tjedana. Ne preporučuje se upotrebljavati Eritromicin otopinu dulje od 6 mjeseci.

Ako primijenite više Eritromicin otopine nego što ste trebali

Obavijestite Vašeg liječnika. Ne primjenjujte više Eritromicin otopine nego što Vam je liječnik propisao.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Eritromicin otopine

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Eritromicin otopinu i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Eritromicin otopinu

Ako ste zaboravili upotrijebiti Eritromicin otopinu kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Eritromicin otopine kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ERITROMICIN OTOPINE

Poput svih lijekova, Eritromicin otopina može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Često može doći do pojave suhe kože, a manje često do crvenila, pečenja, mučnine, proljeva, bolova u trbuhu, svrbeža i lokalne iritacije na mjestu upotrebe. Kod manjeg broja osoba može doći i do alergijske reakcije. Vrlo rijetko može doći do crijevne upale (pseudomembranoznog kolitisa). Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI ERITROMICIN OTOPINU

Eritromicin otopinu čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju. Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Eritromicin otopina se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Eritromicin otopine i sadržaj pakiranja

Eritromicin otopina je bistra i bezbojna otopina. 100 mL otopine u staklenoj bočici na iskapavanje sa zatvaračem na navoj, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

100 mL otopine odgovara 86,8 g otopine.

1 g otopine sadržava 20 mg djelatne tvari eritromicina

Pomoćne tvari: etanol, bezvodni; glicerol

Način izdavanja

Eritromicin otopina se izdaje na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02383/2