

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju ————— 3 kom

100 mg/g ————— salicilatna kiselina
100 mg/g ————— laktatna kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Flaster za odstranjivanje kurjih očiju i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju
3. Kako upotrebljavati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju
4. Koji su neželjeni učinci Flastera za odstranjivanje kurjih očiju
5. Kako čuvati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju
6. Dodatne informacije

ŠTO JE FLASTER ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Kurje oči (clavus) su jako orožena zadebljanja kože koja nastaju pritiskom ili trenjem. Ove promjene su bolne na pritisak i mogu se javiti u osoba svih uzrasta. Najčešće se javljaju na stopalima zbog neodgovarajuće i tijesne obuće. Salicilatna i laktatna kiselina omekšavaju oroženi sloj, čime se olakšava odstranjivanje kurjeg oka.

Flaster je pripravljen tako da nakon što se zaljepi na kurje oko zadržava djelatne tvari na mjestu djelovanja. Time se postiže bolja učinkovitost pripravka i izbjegava oštećenje okolne, zdrave kože.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI FLASTER ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU

Nemojte upotrebljavati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste dijabetičar. U tom slučaju flaster možete koristiti samo pod nadzorom liječnika
- ako imate perifernu neuropatiju ili slabu vensku cirkulaciju
- na bradavicama lica ili anogenitalnog područja, dlakavim bradavicama i madežima
- kod djece mlađe od 2 godine

Budite oprezni s Flasterom za odstranjivanje kurjih očiju

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju ne smije dospjeti na sluznice, na upaljenu ili oštećenu kožu. Upotrebu kod djece mlađe od 16 godina potrebno je provoditi pod nadzorom liječnika.

Upotreba Flastera za odstranjivanje kurjih očiju s drugim lijekovima


Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju bez preporuke liječnika.

KAKO UPOTREBLJAVATI FLASTER ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Flaster za odstranjivanje kurjih očiju posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.



Zahvaćeno područje kože treba namakati u toploj vodi desetak minuta, nakon toga posušiti. Škarama izrežite jedan jastučić s flasterom, zaljepite jastučić na kurje oko i učvrstite flasterom (Slika 1. i 2.).

Pustite da djeluje 3 dana, a potom uz ponovno namakanje u mlakoj vodi, kurje oko odstranite struganjem. Postupak možete ponoviti.

Površinsko struganje kamenom za pete pomaže u odstranjivanju zadebljanja i smanjenju boli. Ne preporučuje se Flaster za odstranjivanje kurjih očiju koristiti dulje od 2 tjedna.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI FLASTERA ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU

Poput svih lijekova, Flaster za odstranjivanje kurjih očiju može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti ili iritacije kože popraćene svrbežom, žarenjem ili crvenilom. Iritacija se češće javlja nanošenjem na zdravu kožu.

Djelovanje Flastera za odstranjivanje kurjih očiju može biti popraćeno privremenim trncima.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

KAKO ČUVATI FLASTER ZA ODSTRANJIVANJE KURJIH OČIJU

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju čuvati na temperaturi do 25°C.
Flaster za odstranjivanje kurjih očiju čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Flaster za odstranjivanje kurjih očiju se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Flastera za odstranjivanje kurjih očiju i sadržaj pakiranja

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju sadržava tri jastučića s djelatnim tvarima, tri vatelinske zaštite, paus traku, omnisilk flaster, celofansku vrećicu u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g podloge sadržava 100 mg djelatne tvari salicilatne kiseline i 100 mg laktatne kiseline

Pomoćne tvari: lanolin; vosak, bijeli

Način izdavanja

Flaster za odstranjivanje kurjih očiju izdaje se bez lječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02194/2