

Gel za desni

10 g

3,3 mg/g	lidokainklorid hidrat
5 mg/g	natrijev hijaluronidat
40 mg/g	kamilica, tekući ekstrakt

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Gel za desni i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Gel za desni
3. Kako upotrebljavati Gel za desni
4. Koji su neželjeni učinci Gela za desni
5. Kako čuvati Gel za desni
6. Dodatne informacije

ŠTO JE GEL ZA DESNI I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Gel za desni je namijenjen za upotrebu u usnoj šupljini. Djelatna tvar je anestetik lidokainklorid hidrat, koji smanjuje podražljivost živaca na bolne podražaje prilikom upale desni ili rasta prvih zubića. Natrijev hijaluronidat omogućava brže zacjeljivanje oštećene sluznice, dok tekući ekstrakt kamilice djeluje protuupalno i antibakterijski.

Gel za desni koristi se kod:

- boli prilikom nicanja mlječnih zubi (mlječna denticija) i pravih zubi (stalna denticija)
- blagih upala, ozljeđivanja ili oticanja desni
- angularnog heilitisa, tj. upale jednog ili oba kuta usana („žvale“)
- kod neudobnosti ili iritacije sluznice usne šupljine uzrokovane zubnim aparatom ili protezom
- afti

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI GEL ZA DESNI

Nemojte upotrebljavati Gel za desni:

- ako ste Vi ili Vaše dijete preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste Vi ili Vaše dijete preosjetljivi–alergični na druge lokalne anestetike amidnog tipa (npr. benzokain)
- ako ste Vi ili Vaše dijete preosjetljivi–alergični na druge biljke iz porodice glavočika (*Asteraceae*)

Budite oprezni s Gelom za desni

Gel za desni nije namijenjen za upotrebu izvan usne šupljine i područja desni. Treba paziti da Gel za desni ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Gela za desni s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Upotreba Gela za desni tijekom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Važne informacije o nekim sastojcima Gela za desni

Gel za desni sadrži:

- etanol
- Ovaj lijek sadrži 36,5 mg alkohola (etanola) po 1 g gela.
Mala količina alkohola u ovojem lijeku ne uzrokuje reakcije.

- natrij
- Ovaj lijek sadrži 26,5 mg natrija po 1 g gela.

KAKO UPOTREBLJAVATI GEL ZA DESNI

Gel za desni uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Gel za desni posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Gel za desni nanosite na oboljelo područje do 3 puta dnevno. Količina gela koja se nanosi pri jednoj primjeni iznosi oko 0,5 g (veličina graška). Gel se nanosi pomoću čistog prsta, laganim umasiravanjem. Prije i nakon upotrebe gela operite ruke.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno je prekinuti primjenu gela i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Gela za desni nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Gela za desni

U slučaju gutanja većeg sadržaja Gela za desni (npr. cijela tuba) odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Gel za desni i ovu uputu sa sobom.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI GELA ZA DESNI

Popot svih lijekova, Gel za desni može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Gela za desni vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti–alergijske reakcije.

Ako ste primijetili navedenu nuspojavu ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Gel za desni i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI GEL ZA DESNI

Gel za desni čuvajte dobro zatvoren, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Gel za desni se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Gela za desni i sadržaj pakiranja

Gel za desni proziran je gel, blijedo žute boje, slatkastog okusa s blagim mirisom kamilice. 10 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 3,3 mg lidokainklorid hidrata, 5 mg natrijevog hijaluronidata i 40 mg tekućeg ekstrakta iz *Matricaria recutita* L., flos (kamilčin cvijet) (1:1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 35 % V/V

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; glicerol; ksilitol; etanol 70 % V/V; hidroksipropilmetilceluloza; dinatrijev edetat; saharinnatrij; natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat

Način izdavanja

Gel za desni dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03037/1