

Hepagal 500, gel — 100 g

500 IU/g — heparinnatrij
50 mg/g — gavez, tinktura

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Hepagal 500 gel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Hepagal 500 gel
3. Kako upotrebljavati Hepagal 500 gel
4. Koji su neželjeni učinci Hepagal 500 gela
5. Kako čuvati Hepagal 500 gel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE HEPAGAL 500 GEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Hepagal 500 gel sadrži djelatne tvari heparinnatrij i tinkturu gaveza. Kada se primjenjuje lokalno na koži heparin sprječava pojavu krvnih ugrušaka u površinskim venama, poboljšava mikrocirkulaciju i smanjuje oticanje. Gavez pomaže kod manjih uganuća i modrica.

Hepagal 500 gel:

- pomaže kod varikoznih vena i upala vena
- sprječava nastajanje krvih ugrušaka u površinskim venama
- olakšava simptome nakon operacije vena
- pomaže kod uklanjanja oteklina, modrica i podlijeva

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI HEPAGAL 500 GEL

Nemojte upotrebljavati Hepagal 500 gel:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako imate ili ste imali stanje koje se zove alergijska trombocitopenija tipa II na heparin (sniženje broja krvnih pločica kao posljedica reakcije preosjetljivosti na heparin)
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama
- kod djece mlađe od 12 godina
- ako ste trudni ili dojite

Budite oprezni s Hepagal 500 gelom ako:

- imate pojačanu sklonost krvarenju.
- U tom slučaju liječnik treba pažljivo procijeniti opravdanost upotrebe Hepagal 500 gela.

Hepagal 500 gel služi samo za vanjsku upotrebu. Koristiti samo na zdravoj koži. Ne smije se nanositi na lice. Nakon upotrebe gela operite ruke.

Treba paziti da Hepagal 500 gel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Hepagal 500 gela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte istovremeno upotrebljavati druge pripravke sa sličnim djelovanjem na istom području.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Hepagal 500 gel bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Hepagal 500 gela

Hepagal 500 gel sadrži:

- metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

Mogu uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

- propilenglikol

Hepagal 500 gel sadrži 50 mg propilenglikola po 1 g gela.

Propilenglikol može uzrokovati iritacije kože.

- etanol

Ovaj lijek sadrži 115 mg alkohola (etanola) po 1 g gela.

Može izazvati osjećaj peckanja na oštećenoj koži. Može iritirati kožu.

KAKO UPOTREBLJAVATI HEPAGAL 500 GEL

Hepagal 500 gel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Hepagal 500 gel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Nanesite gel na čistu i neoštećenu kožu 1 do 3 puta na dan.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 14 dana, potrebno je prekinuti primjenu gela i potražiti savjet liječnika. U kroničnim slučajevima liječnik može preporučiti i dužu primjenu gela.

Ako primijenite više Hepagal 500 gela nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Hepagal 500 gela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Hepagal 500 gel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Hepagal 500 gel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Hepagal 500 gel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI HEPAGAL 500 GELA

Poput svih lijekova, Hepagal 500 gel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Hepagal 500 gela vrlo rijetko može doći do pojave blagog crvenila, svrbeža ili otoka tkiva na mjestu upotrebe, koji se obično brzo povlače nakon prestanka primjene gela.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Hepagal 500 gel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI HEPAGAL 500 GEL

Hepagal 500 gel čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.
Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!
Hepagal 500 gel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.
Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Hepagal 500 gela i sadržaj pakiranja

Hepagal 500 gel je proziran gel karakterističnog mirisa. 100 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 500 IU heparinnatrija, 50 mg tinkture iz *Symphytum officinale* L., radix (gavezov korijen) (1:1,8), ekstrakcijsko otapalo: etanol 68 % V/V

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; etanol (96-postotni); propilenglikol; karbomeri; trolamin; dinatrijev edetat; metilparahidroksibenzoat; čempres, eterično ulje; propilparahidroksibenzoat

Način izdavanja

Hepagal 500 gel dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03260/1