

Kapi protiv zubobolje, otopina

10 mL

100 mg/g	benzokain
100 mg/g	usporavna petoprsta, tinktura
50 mg/g	klinčić, eterično ulje

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebat. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Kapi protiv zubobolje i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Kapi protiv zubobolje
3. Kako upotrebljavati Kapi protiv zubobolje
4. Koji su neželjeni učinci Kapi protiv zubobolje
5. Kako čuvati Kapi protiv zubobolje
6. Dodatne informacije

ŠTO SU KAPI PROTIV ZUBOBOLJE I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Kapi protiv zubobolje ublažavaju upalu zubi i okolnog tkiva te smanjuju osjet boli kod različitih tegoba (pulpitis, periodontitis). Benzokain je lokalni anestetik koji umanjuje osjet boli i neugode. Klinčićevo eterično ulje sadrži eugenol te prirodno ublažava bolove, anestezira, djeluje antibakterijski i sprječava upalu usne šupljine. Tinktura uspravne petoprste sadržava tanine koji djeluju adstringentno, stežu sluznicu i tako smanjuju njezin otok i upalu zubnog mesa.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI KAPI PROTIV ZUBOBOLJE

Nemojte upotrebljavati Kapi protiv zubobolje:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako imate oštećenu sluznicu oko zuba
- kod djece mlađe od 2 godine

Budite oprezni s Kapima protiv zubobolje:

- ako imate bolesti jetre ili bubrega

Upotrebu kod djece mlađe od 12 godine potrebno je provoditi pod nadzorom liječnika.

Kapi protiv zubobolje ne smiju dospjeti u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba obilno isprati vodom kroz 10 minuta i odmah se javiti liječniku.

Upotreba Kapi protiv zubobolje s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Kapi protiv zubobolje bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Kapi protiv zubobolje

Kapi protiv zubobolje sadrže:

- etanol

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

KAKO UPOTREBLJAVATI KAPI PROTIV ZUBOBOLJE

Kapi protiv zubobolje uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Kapi protiv zubobolje posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način upotrebe

Na malu kuglicu vate nakapajte 5–10 kapi i unesite u usnu šupljinu bolnog zuba do 4 puta dnevno. Kod jače boli kapi se mogu nanijeti i na okolno zubno meso pomoću vatiranog štapića. Najmanje pola sata nakon nanošenja lijeka nemojte uzimati hranu i piće niti prati zube. Nakon upotrebe Kapi protiv zubobolje bočicu dobro zatvorite i operite ruke sapunom.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno je prekinuti primjenu kapi i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Kapi protiv zubobolje nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu Kapi protiv zubobolje od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Upotreba znatno većih količina od preporučene dnevne doze može izazvati tegobe poput gubitka osjeta uz mučninu i povraćanje. Sustavno trovanje posljedica je utjecaja na centralni živčani sustav, srce i krvne žile. Prvi znakovi predoziranja su poremećaji središnjeg živčanog sustava. Najčešći simptomi su glavobolja, vrtoglavica, nesvjestica, otežan govor, poremećaj sluha, ubrzano disanje, zbunjenost, umor, nagli pad krvnog tlaka (hipotenzija), usporeni rad srca (bradikardija), poremećaj srčanog ritma (aritmija), zamućen vid, gubitak osjeta okusa.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Kapi protiv zubobolje

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Kapi protiv zubobolje i ovu uputu sa sobom. Može doći do gubitka osjeta uslijed djelovanja anestetika, što može izazvati poteškoće s gutanjem.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Kapi protiv zubobolje

Ako ste zaboravili upotrijebiti Kapi protiv zubobolje kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Kapi protiv zubobolje kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI KAPI PROTIV ZUBOBOLJE

Poput svih lijekova, Kapi protiv zubobolje mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Kapi protiv zubobolje mogu izazvati reakcije preosjetljivosti, poteškoće kod gutanja, blaže tegobe pri disanju, osip, mučninu i povraćanje. Iz dostupnih podataka ne može se procijeniti učestalost nuspojava. Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Kapi protiv zubobolje i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI KAPI PROTIV ZUBOBOLJE

Kapi protiv zubobolje čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju. Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Čuvati daleko od izvora topline i otvorenog plamena! Kapi protiv zubobolje se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 6 mjeseci. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Kapi protiv zubobolje i sadržaj pakiranja

Kapi protiv zubobolje su blago zamućena, crvenkasta otopina s mirisom klinčičevog eteričnog ulja. 10 mL otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

10 mL otopine odgovara 9,3 g otopine

1 g otopine sadržava 100 mg benzokaina, 100 mg tinkture iz *Potentilla erecta* L., rhizoma (podanak uspravne petoprste) (1:5), ekstrakcijsko otapalo: etanol 45 % V/V i 50 mg klinčičevog eteričnog ulja

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; makrogoli; saharinnatrij; etanol (96-postotni)

Način izdavanja

Kapi protiv zubobolje dostupne su bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

00598/1