

Klindamicin, otopina za kožu — 100 mL

6 mg/g ————— klindamicin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Klindamicin otopina i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Klindamicin otopinu
3. Kako upotrebljavati Klindamicin otopinu
4. Koji su neželjeni učinci Klindamicin otopine
5. Kako čuvati Klindamicin otopinu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE KLINDAMICIN OTOPINA I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Klindamicin otopina se upotrebljava za lokalno liječenje akni, posebno upalnih vrsta papula i pustula. Koristi se u liječenju blagih i umjerenih akni. Klindamicin je antibiotik koji zaustavlja rast bakterija.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI KLINDAMICIN OTOPINU

Nemojte upotrebljavati Klindamicin otopinu ako:

- ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ste preosjetljivi–alergični na klindamicin ili na neki drugi antibiotik iz skupine linkozamida
- bolujete od upalnih bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Chronova bolest) ili ste nekada imali upalu crijeva povezanu s primjenom antibiotika

Budite oprezni s Klindamicin otopinom

Klindamicin otopinu treba primjenjivati s oprezom ako ste skloni alergijama. Izbjegavajte upotrebu Klindamicin otopine na očima, ustima ili na oštećenoj koži. Ako otopina dospije na navedene dijelove, dobro ih isperite hladnom vodom. Lokalna upotreba klindamicina može uzrokovati rast neosjetljivih (rezistentnih) mikroorganizama. Ako se pojavi dodatna infekcija tijekom upotrebe Klindamicin otopine odmah prestanite s upotrebom i obavijestite svog liječnika. Budite posebno oprezni ako imate upalnu bolest crijeva ili ste imali kolitis povezan s upotrebom antibiotika. Ako se pojave simptomi poput dugotrajnog ili krvavog proljeva, tijekom ili nakon upotrebe Klindamicin otopine, prekinite s upotrebom te obavijestite svog liječnika. Ovo može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koja se može javiti nakon upotrebe antibiotika. Ne izlažite se otvorenom plamenu dok se pripravak potpuno ne osuši na koži.

Upotreba Klindamicin otopine s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, čak i ako su to lijekovi bez recepta.

Ne preporučuje se istodobna upotreba Klindamicin otopine s drugim preparatima za liječenje akni koji sadržavaju eritromicin. Nemojte istovremeno s Klindamicin otopinom upotrebljavati druge pripreme za liječenje akni (npr. salicilatna kiselina, rezorcinol, tretinoin, benzoilperoksid) bez preporuke liječnika ili ljekarnika. Ako uzimate lijekove iz skupine neuromuskularnih blokatora (lijekovi za opuštanje mišića tijekom anestezije, elektrošokova ili konvulzija) obavijestite vašeg liječnika jer klindamicin može pojačati učinak ovih lijekova. Ako uzimate varfarin ili slične lijekove koji se koriste za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka obavijestite vašeg liječnika jer možete imati veći rizik od krvarenja prilikom primjene Klindamicin otopine. Liječnik vam može redovito provoditi krvne pretrage da provjeri kako Vam se zgrušava krv.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Klindamicin otopinu tijekom trudnoće ili dojenja bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Klindamicin otopine

Klindamicin otopina sadrži:

- etanol

Ovaj lijek sadrži 436 mg alkohola (etanola) po 1 mL otopine. Može izazvati osjećaj peckanja na oštećenoj koži. Može iritirati kožu.

Učinci alkohola pojačani su u novorođenčadi i dojenčadi (mlađe od 2 godine) u usporedbi sa starijom djecom i odraslima zbog bolje apsorpcije kroz kožu. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što date ovaj lijek svojoj bebi.

- propilenglikol

Ovaj lijek sadrži 93 mg propilenglikola po 1 mL otopine. Propilenglikol može uzrokovati iritacije kože. Nemojte koristiti Klindamicin otopinu na dojenčadi ispod 4 tjedna starosti s otvorenim ranama ili na velikoj površini oštećene kože (npr. opekline) bez konzultacije s liječnikom ili ljekarnikom.

KAKO UPOTREBLJAVATI KLINDAMICIN OTOPINU

Klindamicin otopinu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Klindamicin otopinu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Očistite kožu zahvaćenog područja prije upotrebe Klindamicin otopine. Klindamicin otopinu nanosite 2 puta dnevno na zahvaćeno područje tako da potrebnu količinu otopine nanesete na vatru i utapkate po koži. Maksimalno poboljšanje najčešće nastupa za oko 10–12 tjedana. Ne preporučuje se upotrebljavati Klindamicin otopinu dulje od 6 mjeseci.

Ako primijenite više Klindamicin otopine nego što ste trebali

Obavijestite Vašeg liječnika. Ne primjenjujte više Klindamicin otopine nego što Vam je liječnik propisao.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Klindamicin otopine

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Klindamicin otopinu i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Klindamicin otopinu

Ako ste zaboravili upotrijebiti Klindamicin otopinu kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Klindamicin otopine kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klindamicin otopinu prije vremena

Ako prestanete primjenjivati Klindamicin otopinu prije vremena, mogu Vam se simptomi ponovno javiti.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI KLINDAMICIN OTOPINE

Poput svih lijekova, Klindamicin otopina može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Često može doći do pojave suhe kože, a manje često do crvenila, pečenja, mučnine, proljeva, bolova u trbuhu, svrbeža i lokalne iritacije na mjestu upotrebe. Kod manjeg broja osoba može doći i do alergijske reakcije. Vrlo rijetko može doći do crijevne upale (pseudomembranoznog kolitisa).

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI KLINDAMICIN OTOPINU

Klindamicin otopinu čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Klindamicin otopina se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Klindamicin otopine i sadržaj pakiranja

Klindamicin otopina je bistra i bezbojna otopina. 100 mL otopine u staklenoj bočici na iskapavanje sa zatvaračem na navoj, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

100 mL otopine odgovara 93 g otopine.

1 g otopine sadržava 6 mg klindamicina u obliku klindamicinklorida

Pomoćne tvari: etanol (96-postotni); voda, pročišćena; propilenglikol

Način izdavanja

Klindamicin otopina se izdaje na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02368/1