


Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe trebate okrenuti nastavak za raspršivanje pod pravim kutom u odnosu na bočicu.



Slika 2. Usta treba jako otvoriti, usmjeriti sprej prema ždrijelu i pritisnuti raspršivač. Zadržite dah tijekom ubrizgavanja spreja.

Nakon upotrebe nastavak za raspršivanje treba okrenuti prema dolje pri čemu se blokira raspršivač. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 5 dana, potrebno je prekinuti primjenu spreja i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Laringal spreja nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu spreja od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Prvi znakovi predoziranja su poremećaji kardiovaskularnog i središnjeg živčanog sustava. Poremećaj središnjeg živčanog sustava se očituje kao nemir, zbunjenost, zujanje u ušima, vrtoglavica, nistagmus, zamućen vid, mučnina, povraćanje, tremor i konvulzije. Kardiovaskularne nuspojave su pad krvnog tlaka (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), srčani zastoj (arest). Nakon upotrebe prevelikih doza (više od jedne bočice spreja na dan) mogu se javiti smetnje pri gutanju (smanjena kontrola refleksa gutanja).

Ako ste zaboravili upotrijebiti Laringal sprej

Ako ste zaboravili upotrijebiti Laringal sprej kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Laringal spreja kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI LARINGAL SPREJA

Poput svih lijekova, Laringal sprej može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti (alergijska reakcija). Ako primijetite simptome kao što su osip, svrbež, otok kože i otežano disanje odmah potražite pomoć liječnika. Ako ste preosjetljivi na lidokain (poznat i pod nazivom ksilokain), postoji mogućnost da ste preosjetljivi i na druge lokalne anestetike iste skupine (npr. benzokain, prokain, tetrakain).

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati sprej i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI LARINGAL SPREJ

Laringal sprej čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju. Čuvajte ga temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Laringal sprej se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 6 mjeseci. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Laringal spreja i sadržaj pakiranja

Laringal sprej je blago zamućena, svijetložuta otopina s okusom naranče. 30 mL otopine u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj, mehaničkim raspršivačem i nastavkom za raspršivanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine sadržava 5 mg lidokainklorida, 1,7 mg eteričnog ulja australskog čajevca i 50 mg dekspantenola

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; polisorbat 20; eterično ulje slatke naranče; saharinnatrij; kalijev sorbat

Način izdavanja

Laringal sprej dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

03412/2