

Lidokain, gel

30 g

20 mg/g

lidokainklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Lidokain gel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Lidokain gel
3. Kako upotrebljavati Lidokain gel
4. Koji su neželjeni učinci Lidokain gela
5. Kako čuvati Lidokain gel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE LIDOKAIN GEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Lidokain gel sadržava djelatnu tvar lidokainklorid. Lidokainklorid je lokalni anestetik koji se koristi za uklanjanje osjeta na određenom dijelu tijela. Koristi se za lokalnu anesteziju prije raznih zahvata i invazivnih pregleda.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI LIDOKAIN GEL

Nemojte upotrebljavati Lidokain gel:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na druge lokalne anestetike amidnog tipa (npr. benzokain)
- na sluznicama oka
- kod djece mlađe od 2 godine

Budite oprezni s Lidokain gelom:

- ako imate lokalnu infekciju na mjestu aplikacije
- u slučaju oštećenja sluznice
- ako bolujete od epilepsije, porfirije, imate teška oštećenja srca, probleme s funkcijom jetre ili bubrega

Ne upotrebljavajte ga u slušnom kanalu ako je došlo do puknuća bubnjića.

Ako se Lidokain gel nanosi u usnu šupljinu može otežati gutanje i povećati opasnost od aspiracije. Utrnutost jezika i sluznice može dovesti do slučajnih ugriza u usnoj šupljini.

Treba paziti da Lidokain gel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Za upotrebu kod djece mlađe od 2 godine potrebno se savjetovati s liječnikom.

Upotreba Lidokain gela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Antiaritmici i ostali anestetici mogu stupiti u interakciju s Lidokain gelom. Ako se Lidokain gel koristi duže vrijeme propranolol, cimetidin i fluvoksamin također mogu stupiti u interakciju s Lidokain gelom.

Lidokain gel može utjecati na učinkovitost određenih cjepiva (npr. cjepivo protiv tuberkuloze), ako se primjeni nedugo nakon upotrebe Lidokain gela i na području gdje gel djeluje.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Lidokain gel bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Lidokain gela

Lidokain gel sadrži:

- metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
- Mogu uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

KAKO UPOTREBLJAVATI LIDOKAIN GEL

Lidokain gel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Lidokain gel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako primijenite više Lidokain gela nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane javite se liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja mogu biti zamućen vid, pospanost, vrtoglavica, otežano disanje, bol u prsima i nepravilan rad srca.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Lidokain gela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Lidokain gel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Lidokain gel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Lidokain gel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI LIDOKAIN GELA

Poput svih lijekova, Lidokain gel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Rijetko se može pojaviti alergijska reakcija u obliku crvenila, svrbeža, osipa, oteknuća, niskog krvnog tlaka ili anafilaktičkog šoka.

Prevelike doze gela ili često primjenjivanje doza mogu dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih i neuroloških nuspojava.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Lidokain gel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI LIDOKAIN GEL

Lidokain gel čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Lidokain gel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Lidokain gela i sadržaj pakiranja

Lidokain gel je proziran gel bez mirisa. 30 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom te sterilnim aplikatorom u zaštitnoj vrećici.

Sastav:

1 g gela sadržava 20 mg lidokainklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; hipromeloza; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; natrijev hidroksid

Način izdavanja

Lidokain gel je dostupan na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02744/1