

Mast za hemoroide — 30 g

50 mg/g	_____	cinkov oksid
50 mg/g	_____	peruanski balzam
25 mg/g	_____	bizmutov subgalat
20 mg/g	_____	lidokain

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Mast za hemoroide i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Mast za hemoroide
3. Kako upotrebljavati Mast za hemoroide
4. Koji su neželjeni učinci Masti za za hemoroide
5. Kako čuvati Mast za hemoroide
6. Dodatne informacije

ŠTO JE MAST ZA HEMOROIDE I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Mast za hemoroide je namijenjena za terapiju vanjskih i unutarnjih hemoroida, analnih fisura, ekcema anusa i svrbeža u analnom području. Pospješuje zacjeljivanje oštećene sluznice anusa te olakšava neugodne tegobe koje prate pojavu hemoroida kao što su bol, pečenje i svrbež. Bizmutov subgalat i cinkov oksid stežu upaljeno tkivo te pomažu sušenju rana i smanjuju otok oštećene sluznice. Lidokain je lokalni anestetik koji umanjuje osjet boli, žarenja i svrbeža.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI MAST ZA HEMOROIDE

Nemojte upotrebljavati Mast za hemoroide:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu
- ako ste preosjetljivi-alergični na druge lokalne anestetike amidnog tipa (npr. benzokain)
 - ako simptomi koji Vas muče nisu posljedica hemoroida nego ozbiljnijih crijevnih bolesti poput ulceroznog kolitisa ili Chronove bolesti
 - kod djece mlađe od 12 godina

Budite oprezni s Masti za hemoroide:

- ako imate obilno krvarenje iz hemoroida
- ako ste nedavno imali operativni zahvat

Treba paziti da Masti za hemoroide ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Ako se pojave smetnje popraćene oticanjem tkiva i bolovima, potrebno je prekinuti upotrebu i javiti se liječniku.

Upotreba Masti za hemoroide s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi Masti za hemoroide kod trudnica i dojilja. Iz tog razloga Mast za hemoroide se ne smije upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik/ginekolog smatra da je neophodno.

Važne informacije o nekim sastojcima Masti za hemoroide


Mast za hemoroide sadrži:

- peruanski balzam
Može uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

- lanolin
Može uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

KAKO UPOTREBLJAVATI MAST ZA HEMOROIDE

Mast za hemoroide uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako upotrebljavati Mast za hemoroide posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.



Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, dva do tri puta dnevno ili nakon stolice potrebno je istisnuti jedan centimetar Masti za hemoroide (Slika 1.) i čistim prstom lagano utrljati mast na vanjske hemoroide. Kod unutarnjih hemoroida, na otvor tube pričvrstite plastični nastavak za analnu upotrebu (Slika 2.), lagano ga uvucite u otvor anusa i polako istisnite malo masti.

Prije upotrebe Masti za hemoroide potrebno je analno područje isprati mlazom mlake vode ili fiziološke otopine.

Prije i nakon upotrebe Masti za hemoroide potrebno je oprati ruke. Prilikom nanošenja masti mogu se koristiti i rukavice.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 14 dana, potrebno je prekinuti primjenu masti i potražiti savjet liječnika.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali Mast za hemoroide

U slučaju gutanja, posebno kod male djece, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Mast za hemoroide i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za hemoroide

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za hemoroide kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu Masti za hemoroide kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI MASTI ZA HEMOROIDE

Poput svih lijekova, Mast za hemoroide može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti u obliku nadražaja sluznice rektuma, osjećaja nelagode i lokalne iritacije.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI MAST ZA HEMOROIDE

Mast za hemoroide čuvajte u originalnom pakiranju.

Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Mast za hemoroide se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Masti za hemoroide i sadržaj pakiranja

Mast za hemoroide je žuto-smeđe boje, karakterističnog mirisa. 30 g masti u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g masti sadržava 50 mg cinkovog oksida, 50 mg peruanskog balzama, 25 mg bizmutovog subgalata i 20 mg lidokaina

Pomoćne tvari: lanolin; vazelin, bijeli; parafin, tekući; gospina trava, zelen, ekstrakt; kamilica, tekući ekstrakt (1:1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 35 % V/V; čempres, eterično ulje

Način izdavanja

Mast za hemoroide dostupna je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00910/1