

Mast za herpes ————— 10 g

100 mg/g	_____	cinkov oksid
25 mg/g	_____	lidokain
40 mg/g	_____	eterično ulje australskog čajevca
20 mg/g	_____	sumpor

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebat. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Mast za herpes i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Mast za herpes
3. Kako upotrebljavati Mast za herpes
4. Koji su neželjeni učinci Masti za herpes
5. Kako čuvati Mast za herpes
6. Dodatne informacije

ŠTO JE MAST ZA HERPES I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Mast za herpes se upotrebljava za liječenje „groznice“ (*herpes labialis*) uzrokovane *Herpes simplex* virusom, koja se najčešće pojavljuje na usnama i koži oko usta i nosa. Cinkov oksid u dodiru sa sekretima sluznice stvara cinkate koji stežu oboljelo tkivo. Lidokain je lokalni anestetik koji smanjuje osjet boli i nelagodu. Eterično ulje australskog čajevca djeluje antiseptički- sprječava rast i razvoj mikroorganizama: virusa, bakterija i gljivica na oboljelom području. Sumpor djeluje blago antiseptički te kao keratolitik potiče obnovu oštećenog tkiva. Mast za herpes se može upotrebljavati i kod infekcija *Herpes zoster* virusom prema liječničkoj uputi.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI MAST ZA HERPES

Nemojte upotrebljavati Mast za herpes:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama

Budite oprezni s Masti za herpes

Mast za herpes služi samo za vanjsku upotrebu. Nakon upotrebe masti operite ruke. Upotrebu kod djece mlađe od 2 godine potrebno je provoditi pod nadzorom liječnika.

Treba paziti da Mast za herpes ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Masti za herpes s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Mast za herpes bez preporuke liječnika.

KAKO UPOTREBLJAVATI MAST ZA HERPES

Mast za herpes uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Mast za herpes posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Mast za herpes nanosite na oboljelo područje 5 puta dnevno, već pri pojavi prvih simptoma kao što su bockanje, svrbež i pečenje. Prije i nakon upotrebe masti operite ruke.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno je prekinuti primjenu masti i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Masti za herpes nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu masti od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Masti za herpes

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Mast za herpes i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za herpes

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za herpes kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI MASTI ZA HERPES

Poput svih lijekova, Mast za herpes može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Masti za herpes može doći do pojave blagog crvenila, osjećaja žarenja i lokalne iritacije na mjestu upotrebe. U slučaju smetnji s oticanjem tkiva i bolovima potrebno je prekinuti upotrebu i javiti se liječniku.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Mast za herpes i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI MAST ZA HERPES

Mast za herpes čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju.
Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!
Mast za herpes se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Masti za herpes i sadržaj pakiranja

Mast za herpes je mast boje kože i mirisa na eterično ulje čajevca. 10 g masti u plastičnoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g masti sadržava 100 mg cinkovog oksida, 25 mg lidokaina, 40 mg eteričnog ulja australskog čajevca i 20 mg sumpora

Pomoćne tvari: vazelin, bijeli; parafin, tekući; voda, pročišćena; cetilpalmitat; vosak, bijeli; natrijev tetraborat; boja titanijev dioksid (E171); boja željezov oksid, crveni (E172), kalijev aluminijev silikat (E555)

Način izdavanja

Mast za herpes dostupna je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

00602/2