

Mast za reumu — 30 g

45 mg/g	_____	<i>kamfor, racemični</i>
45 mg/g	_____	<i>metilsalicilat</i>
30 mg/g	_____	<i>eukaliptus, eterično ulje</i>
30 mg/g	_____	<i>terpentinsko ulje</i>

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Mast za reumu i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Mast za reumu
3. Kako upotrebljavati Mast za reumu
4. Koji su neželjeni učinci Masti za reumu
5. Kako čuvati Mast za reumu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE MAST ZA REUMU I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Mast za reumu se koristi za ublažavanje reumatske boli mišića i zglobova. Upotrebljava se kod upala zglobova i mišića, lumbaga (križobolje), išijasa, grčeva u mišićima, istegnuća mišića ili tetiva, fibromijalgije, uganuća, modrica i sportskih povreda.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI MAST ZA REUMU

Nemojte upotrebljavati Mast za reumu:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na salicilate (npr. acetilsalicilatna kiselina) ili druge protuupalne lijekove (npr. ibuprofen, ketoprofen, naproksen)
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama
- kod djece mlađe od 6 godina

Budite oprezni s Masti za reumu ako:

- imate astmu
- ste skloni ekcemima
- uzimate lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (varfarin)

Mast za reumu služi samo za vanjsku upotrebu. Koristiti samo na zdravoj koži. Ne smije se nanositi na lice. Nakon upotrebe masti operite ruke.

Treba paziti da Mast za reumu ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Djeca i adolescenti

Postoji moguća povezanost između primjene acetilsalicilatne kiseline i pojave Reyea sindroma (bolest koja uzrokuje oticanje jetre i mozga) u djece.

Mast za reumu treba s oprezom primjenjivati u djece mlađe od 16 godina. Ne smije se primjenjivati na većoj površini tijela, dulji vremenski period ili ispod obloga i zavoja.

Upotreba Masti za reumu s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Obratite se liječniku prije primjene ove masti ako uzimate lijekove koji razrjeđuju krv ili sprječavaju stvaranje ugrušaka (antikoagulanse ili antitrombocitne lijekove), uključujući acetilsalicilatnu kiselinu.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Mast za reumu bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Masti za reumu

Mast za reumu sadrži:

- lanolin
- Može uzrokovati lokalne iritacije kože (npr. kontaktni dermatitis).
- cetilni i stearilni alkohol
- Mogu uzrokovati lokalne iritacije kože (npr. kontaktni dermatitis).
- butilhidroksitoluen
- Može uzrokovati lokalne iritacije kože (npr. kontaktni dermatitis) ili iritacije očiju i sluznica.

KAKO UPOTREBLJAVATI MAST ZA REUMU

Mast za reumu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Mast za reumu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Mast za reumu upotrebljavajte isključivo za mazanje na neoštećenoj koži. Mast namažite najprije na malom dijelu kože. Nakon desetak minuta provjerite reakciju kože. Ako nema pojačanog nadražaja, nastavite s upotrebom na većoj površini kože.

Mast za reumu nanesite u tankom sloju na oboljela mjesta do 4 puta dnevno. Lagano umasirajte mast na oboljelo područje. Ako ne liječite ruke operite ih nakon upotrebe masti. Kod ukočenosti i grčeva u mišićima nanesite Mast za reumu nakon tople kupke, na osušenoj koži. Nemojte prekrivati kožu oblozima, flasterima ili drugim zavojima.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 14 dana, potrebno je prekinuti primjenu masti i potražiti savjet liječnika.

Ako primijenite više Masti za reumu nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu masti od propisane odstranite višak papirnatom maramicom. Nakon primjene rijetko može doći do sistemske toksičnosti, ako se velike količine Masti za reumu primijene na velikoj površini kože može doći do akutnog trovanja salicilatima. Simptomi trovanja su glavobolja, mučnina, vrtoglavica, povraćanje, poremećaj sluha, šum u uhu, pojačano znojenje, bljedilo te ubrzano i duboko disanje. Nakon prestanka korištenja masti simptomi nestaju.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Masti za reumu

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Mast za reumu i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za reumu

Ako ste zaboravili upotrijebiti Mast za reumu kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte koristiti Mast za reumu više od 3 puta na dan.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI MASTI ZA REUMU

Poput svih lijekova, Mast za reumu može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Masti za reumu može doći do pojave blagog crvenila, osjećaja žarenja i osipa na mjestu upotrebe. U nekim slučajevima može doći do lokalne iritacije kože, naročito kod osoba s osjetljivom kožom ili kod osoba koje su osjetljive na acetilsalicilatnu kiselinu i druge salicilate, stvaranja mjehura i opekline. Upotreba Masti za reumu ne velikoj površini kože ili zagrijavanje premazane površine mogu uzrokovati pojavu sistemskih neželjenih djelovanja u obliku zujanja u ušima, vrtoglavice, znojenja, nagona na povraćanje, poremećaja disanja, konfuzije, dezorijentacije, konvulzija i kome. Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Mast za reumu i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI MAST ZA REUMU

Mast za reumu čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju. Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Mast za reumu se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Masti za reumu i sadržaj pakiranja

Mast za reumu je mast bijele boje i intenzivnog mirisa. 30 g masti u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g masti sadržava 45 mg kamfora, racemičnog, 45 mg metilsalicilata, 30 mg terpentinskog ulja i 30 mg eukaliptusovog eteričnog ulja

Pomoćne tvari: vazelin, bijeli; lanolin; vosak, bijeli; cetilni i stearilni alkohol; butilhidroksitoluen; lavandin, eterično ulje; čempres, eterično ulje

Način izdavanja

Mast za reumu dostupna je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko–dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

00601/1