

Nazosol kapi za nos, otopina

10 mL

0,5 mg/g
1 mg/g

nafazolinklorid
nafazolinklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Nazosol kapi za nos i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Nazosol kapi za nos
3. Kako upotrebljavati Nazosol kapi za nos
4. Koji su neželjeni učinci Nazosol kapi za nos
5. Kako čuvati Nazosol kapi za nos
6. Dodatne informacije

ŠTO SU NAZOSOL KAPI ZA NOS I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Djelatna tvar u Nazosol kapima za nos je nafazolinklorid. Nafazolinklorid je simpatomimetik koji smanjuje otečenost sluznice stezanjem krvnih kapilara u sluznici nosa. Smanjena otečenost sluznice dovodi do manje začepljenosti nosa, olakšanog istjecanja sekreta i nesmetanog disanja. Nazosol kapi za nos upotrebljavaju se za simptomatsko liječenje rinitisa, sinusitisa te za dekongestiju Eustahijeve tube kod upale uha. Također se upotrebljavaju za zaustavljanje krvarenja iz nosa i pripremu za preglede ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI NAZOSOL KAPI ZA NOS

Nemojte upotrebljavati Nazosol kapi za nos:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi-alergični na druge simpatomimetike
- ako imate suhu upalu nosne sluznice s posljedičnim nastankom krasta (rhinitis sicca)
- ako imate glaukom zatvorenog kuta
- kod djece ispod 6 godina (0,5 mg/mL), odnosno ispod 12 godina (1 mg/mL)

Budite oprezni s Nazosol kapima za nos:

- ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitori) ili druge lijekove koji mogu povisiti arterijski krvni tlak
- ako imate povišen očni tlak, osobito glaukom uskog kuta
- ako imate tešku kardiovaskularnu bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija)
- ako imate metaboličke poremećaje (hipertireoza, dijabetes, porfirija)
- ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- ako imate povećanu prostatu
- kod anestezije lijekovima koji mogu pojačati osjetljivost na simpatomimetike kao što je nafazolin (trikloretilen, ciklopropan, halotan)
- kod stanja nakon transsfenoidalne operacije hipofize ili nekog drugog zahvata tijekom kojeg je izložena tvrda moždana ovojnica

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Nazosol kapi za nos.

Upotreba Nazosol kapi za nos s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Istovremena upotreba Nazosol kapi za nos s određenim lijekovima za depresiju (triciklički antidepressivi ili MAO inhibitori), kao i s lijekovima za sniženje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), može dovesti do porasta krvnog tlaka.

Istodobna upotreba Nazosol kapi za nos sa srčanim glikozidima (digoksinom) može povećati rizik nastanka nepravilnosti u srčanom ritmu.

Uzimanje Nazosol kapi za nos s lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. bromokriptin) može dovesti do aditivne kardiovaskularne toksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi Nazosol kapi za nos kod trudnica i dojilja. Iz tog razloga Nazosol kapi za nos se ne smiju upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik smatra da je neophodno. U tom slučaju Nazosol kapi za nos treba upotrebljavati kratko vrijeme i u najnižoj dozi.

Važne informacije o nekim sastojcima Nazosol kapi za nos

Nazosol kapi za nos sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 mL otopine.

Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj ili oticanje sluznice u nosu, osobito kada se koristi duže vrijeme.

Dugotrajne primjena može uzrokovati edem sluznice nosa.

KAKO UPOTREBLJAVATI NAZOSOL KAPI ZA NOS

Nazosol kapi za nos uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Nazosol kapi za nos posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.


Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:

DOB	NAZOSOL kapi za nos	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca od 6 do 12 godina	0,5 mg/mL	1 do 2 kapi	do 4 puta 1-2 kapi
Djeca starija od 12 godina i odrasli	1 mg/mL	2 do 3 kapi	do 4 puta 2-3 kapi

Kod krvarenja iz nosa tampon od gaze natopljen otopinom uvesti u nosnicu i ostaviti 2-5 minuta.

Način upotrebe

Dojenčadi i djeci do 2 godine vatiranim štapićem lagano očistite nos. Pola sata prije hranjenja i pred spavanje, u sjedećem ili ležećem položaju s glavom zabačenom unatrag, ukapajte 1 kap do 3 puta dnevno.



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj.

Slika 2. Prije upotrebe Nazosol kapi, lagano ispušite nos. U sjedećem ili ležećem položaju, s glavom zabačenom unatrag ukapajte 1 do 2 kapi u obje nosnice prema potrebi, ali ne više od 4 puta na dan. Držite glavu u istom položaju još nekoliko minuta kako bi se olakšao prolaz kapi kroz nos.

Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za nos smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati sluznicu nosa kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj. Nemojte koristiti Nazosol kapi za nos češće nego li je preporučeno niti duže od 5 dana. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 5 dana, potrebno je prekinuti primjenu kapi i potražiti savjet liječnika. Ako je produženo liječenje neophodno, treba ga nastaviti nakon pauze od 3 do 5 dana.

Ako primijenite više Nazosol kapi za nos nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za nos od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja su nemir, agitacija, širenje zjenica (midrijaza), podrhtavanje ruku, bljedilo kože, mučnina, povraćanje, pospanost, glavobolja, povišen krvni tlak (hipertenzija), ubrzan rad srca (tahikardija). Unos jako velike količine Nazosol kapi za nos može uzrokovati snižen krvni tlak (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), pad tjelesne temperature (hipotermija) i prestanak disanja (apneja). Kod djece, posebno mlađe od 1 godine, može doći i do poremećaja svijesti te kome.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Nazosol kapi za nos

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Nazosol kapi za nos i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Nazosol kapi za nos

Ako ste zaboravili upotrijebiti Nazosol kapi za nos kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Nazosol kapi za nos kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI NAZOSOL KAPI ZA NOS

Poput svih lijekova, Nazosol kapi za nos mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nazosol kapi za nos mogu izazvati lokalni nadražaj sluznice praćen lokalnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće. Mogu izazvati i neke sistemske nuspojave kao što su glavobolja, omaglica, poremećaj svijesti, povišen krvni tlak (hipertenzija), palpitacije, ubrzan rad srca (tahikardija), nemir, umor, mučnina, slabost, pad tjelesne temperature (hipotermija).

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Nazosol kapi za nos.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Nazosol kapi za nos i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI NAZOSOL KAPI ZA NOS

Nazosol kapi za nos čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju. Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Nazosol kapi za nos se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 2 mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Nazosol kapi za nos i sadržaj pakiranja

Nazosol kapi za nos su bistra, bezbojna otopina. 10 mL otopine u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine Nazosol 0,5 mg/mL kapi za nos sadržava 0,5 mg nafazolinklorida
1 mL otopine Nazosol 1 mg/mL kapi za nos sadržava 1 mg nafazolinklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; natrijev hidrogenfosfat dihidrat; natrijev klorid; benzalkonijev klorid

Način izdavanja

Nazosol kapi za nos dostupne su bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00605/1