

Nazosol sprej za nos, otopina

10 mL

1 mg/g

nafazolinklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Nazosol sprej za nos i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Nazosol sprej za nos
3. Kako upotrebljavati Nazosol sprej za nos
4. Koji su neželjeni učinci Nazosol spreja za nos
5. Kako čuvati Nazosol sprej za nos
6. Dodatne informacije

ŠTO JE NAZOSOL SPREJ ZA NOS I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Djelatna tvar u Nazosol spreju za nos je nafazolinklorid. Nafazolinklorid je simpatomimetik koji smanjuje otečenost sluznice stezanjem krvnih kapilara u sluznici nosa. Smanjena otečenost sluznice dovodi do manje začepljenosti nosa, olakšanog istjecanja sekreta i nesmetanog disanja. Nazosol sprej za nos upotrebljava se za simptomatsko liječenje rinitisa, sinusitisa te za dekongestiju Eustahijeve tube kod upale uha. Također se upotrebljava za zaustavljanje krvarenja iz nosa i pripremu za preglede ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI NAZOSOL SPREJ ZA NOS

Nemojte upotrebljavati Nazosol sprej za nos:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi-alergični na druge simpatomimetike
- ako imate suhu upalu nosne sluznice s posljedičnim nastankom krasta (*rhinitis sicca*)
- ako imate glaukom zatvorenog kuta
- kod djece ispod 12 godina

Budite oprezni s Nazosol sprejom za nos:

- ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitori) ili druge lijekove koji mogu povišiti arterijski krvni tlak
- ako imate povišen očni tlak, osobito glaukom uskog kuta
- ako imate tešku kardiovaskularnu bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija)
- ako imate metaboličke poremećaje (hipertireoza, dijabetes, porfirija)
- ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- ako imate povećanu prostatu
- kod anestezije lijekovima koji mogu pojačati osjetljivost na simpatomimetike kao što je nafazolin (trikloretilen, ciklopropan, halotan)
- kod stanja nakon transsfenoidalne operacije hipofize ili nekog drugog zahvata tijekom kojeg je izložena tvrda moždana ovojnica

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Nazosol spreja za nos.

Upotreba Nazosol spreja za nos s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Istovremena upotreba Nazosol spreja za nos s određenim lijekovima za depresiju (triciklički antidepresivi ili MAO inhibitori), kao i s lijekovima za sniženje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), može dovesti do porasta krvnog tlaka.

Istodobna upotreba Nazosol spreja za nos sa srčanim glikozidima (digoksinom) može povećati rizik nastanka nepravilnosti u srčanom ritmu.

Uzimanje Nazosol spreja za nos s lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. bromokriptin) može dovesti do aditivne kardiovaskularne toksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi Nazosol spreja za nos kod trudnica i dojilja. Iz tog razloga Nazosol sprej za nos se ne smije upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik smatra da je neophodno. U tom slučaju Nazosol sprej za nos treba upotrebljavati kratko vrijeme i u najnižoj dozi.

Važne informacije o nekim sastojcima Nazosol spreja za nos

Nazosol kapi za nos sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 mL otopine.

Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj ili oticanje sluznice u nosu, osobito kada se koristi duže vrijeme.

Dugotrajne primjena može uzrokovati edem sluznice nosa.

KAKO UPOTREBLJAVATI NAZOSOL SPREJ ZA NOS

Nazosol sprej za nos uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Nazosol sprej za nos posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:

DOB	NAZOSOL sprej za nos	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca starija od 12 godina i odrasli	1 mg/mL	1 potisak	do 3 puta po 1 potisak

Kod krvarenja iz nosa tampon od gaze natopljen otopinom uvesti u nosnicu i ostaviti 2-5 minuta.

Način upotrebe

Prije upotrebe Nazosol spreja za nos, lagano ispušite nos.



Slika 1. Skinite zaštitni poklopac. Bijeli nastavak pritisnite nekoliko puta dok se ne pojavi prvi mlaz. Nakon toga je bočica spremna za raspršivanje i upotrebu.



Slika 2. Vrh nastavka za nos stavite u nosnicu, pumpicu pritisnite jedan put i lagano udahnite kroz nos. Pri tom bočicu držite uspravno, a glavu ne zabacujte unatrag. Na kraju popustite pritisak na raspršivač i ponovite postupak s drugom nosnicom.

Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu spreja za nos smije koristiti samo jedna osoba. Nakon upotrebe vrh raspršivača obrišite i zatvorite priloženim poklopcem. Nemojte koristiti Nazosol sprej za nos češće nego li je preporučeno niti duže od 5 dana. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 5 dana, potrebno je prekinuti primjenu spreja i potražiti savjet liječnika. Ukoliko je produženo liječenje neophodno, treba ga nastaviti nakon pauze od 3 do 5 dana.

Ako primijenite više Nazosol spreja za nos nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu spreja za nos od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja su nemir, agitacija, širenje zjenica (midrijaza), podrhtavanje ruku, blijedilo kože, mučnina, povraćanje, pospanost, glavobolja, povišen krvni tlak (hipertenzija), ubrzan rad srca (tahikardija). Unos jako velike količine Nazosol spreja za nos može uzrokovati snižen krvni tlak (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), pad tjelesne temperature (hipotermija) i prestanak disanja (apneja). Kod djece, posebno mlade od 1 godine, može doći i do poremećaja svijesti te kome.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Nazosol spreja za nos

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Nazosol sprej za nos i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Nazosol sprej za nos

Ako ste zaboravili upotrijebiti Nazosol sprej za nos kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Nazosol spreja za nos kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI NAZOSOL SPREJA ZA NOS

Poput svih lijekova, Nazosol sprej za nos može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nazosol sprej za nos može izazvati lokalni nadražaj sluznice praćen lokalnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće. Može izazvati i neke sistemske nuspojave kao što su glavobolja, omaglica, poremećaj svijesti, povišen krvni tlak (hipertenzija), palpitacije, ubrzan rad srca (tahikardija), nemir, umor, mučnina, slabost, pad tjelesne temperature (hipotermija).

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do kroničnog oticanja, oštećenja sluznice i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Nazosol spreja za nos.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Nazosol sprej za nos i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI NAZOSOL SPREJ ZA NOS

Nazosol sprej za nos čuvajte dobro zatvoren, u originalnom pakiranju. Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Nazosol sprej za nos se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog korištenja spreja je 2 mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Nazosol spreja za nos i sadržaj pakiranja

Nazosol sprej za nos je bistra, bezbojna otopina. 10 mL otopine u plastičnoj (HDPE) bočici s plastičnim sustavom za raspršivanjem i zaštitnom kapičom, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine Nazosol 1 mg/mL spreja za nos sadržava 1 mg nafazolinklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; natrijev hidrogenfosfat dihidrat; natrijev klorid; benzalkonijev klorid

Način izdavanja

Nazosol sprej za nos dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak