

Otomar sprej za uho,
otopina

10 mL

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Otomar sprej za uho i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Otomar sprej za uho
3. Kako upotrebljavati Otomar sprej za uho
4. Koji su neželjeni učinci Otomar spreja za uho
5. Kako čuvati Otomar sprej za uho
6. Dodatne informacije

ŠTO JE OTOMAR SPREJ ZA UHO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Otomar sprej za uho se koristi za prevenciju ili dodatnu terapiju kod upale vanjskog uha. Upala vanjskog uha najčešće nastaje zbog zadržavanja vode u ušnom kanalu, naročito ljeti prilikom plivanja, kupanja, ronjenja ili drugih vodenih sportova. Zadržavanjem vode u ušnom kanalu stvara se vlažna i topla sredina koja pogoduje nastanku upala. Upala vanjskog uha se stoga zove i "plivačko uho", a popraćena je svrbežom, peckanjem i bolom uha. Otomar sprej isušuje uho, optimizira pH vrijednost i tako sprječava nastanak upale.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI OTOMAR SPREJ ZA UHO

Nemojte upotrebljavati Otomar sprej za uho:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu
- ako imate oštećen ili perforiran bubnjić
- ako imate iscjedak iz uha ili tešku upalu unutrašnjeg kanala uha
- kod djece mlađe od 3 godine

Budite oprezni s Otomar sprejem za uho

Treba paziti da Otomar sprej za uho ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba obilno ispirati vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Otomar sprej za uho se može upotrebljavati kod djece u dobi do 3 godine samo pod liječničkim nadzorom. Ako ste imali ili imate problem s vanjskim uhom posavjetujte se s ljekarnikom ili liječnikom.

Upotreba Otomar spreja za uho s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema podataka da se Otomar sprej za uho ne bi smio upotrebljavati tijekom trudnoće i dojenja.

PRIJE KORIŠTENJA NOVOG PAKIRANJA

Prije korištenja novog pakiranja Otomar spreja za uho protresite i zatim pritisnite raspršivač 3 ili 4 puta dok se ne stvori fina maglica. Pri tom postupku pazite da ne usmjerite raspršivač prema sebi ili drugima. Ovim postupkom pripremit ćete sprej za upotrebu.

KAKO UPOTREBLJAVATI OTOMAR SPREJ ZA UHO

Otomar sprej za uho uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako treba upotrebljavati Otomar sprej za uho, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Otomar sprej za uho mogu koristiti odrasli i djeca iznad 3 godine.		
DOB	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca od 3 do 12 godina	1 do 2 potiska spreja u zvukovod	1 put dnevno po 1 do 2 potiska
Djeca starija od 12 godina i odrasli	2 do 3 potiska spreja u zvukovod	1 put dnevno po 2 do 3 potiska

Način upotrebe

Povucite ušku prema gore i nazad. Držite bočicu uspravno s aplikatorom stavljenim u zvukovod (ušni kanal), stisnite do kraja raspršivač onoliko puta koliko vam apliciranja treba.

Ostavite sprej da djeluje 20 do 30 sekundi, držeći pritom glavu nagnutu u stranu. Nakon toga ispravite glavu i obrišite suvišak tekućine. Preostalu tekućinu u zvukovodu ostavite da ispari. Postupak ponoviti na drugom uhu.

Ako ste upotrijebili više Otomar spreja za uho nego što ste trebali

Predoziranje ili otrovanje su malo vjerojatni kod lokalne upotrebe lijeka u uho. Simptomi predoziranja su otežano dizanje i nesvjestica. Ako ste upotrijebili veću količinu spreja za uho od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku u slučaju pojave simptoma predoziranja.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Otomar spreja za uho

U slučaju gutanja obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Otomar sprej za uho i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Otomar sprej za uho

Ako ste zaboravili upotrijebiti Otomar sprej za uho kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrebljavati dvostruku količinu Otomar spreja kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI OTOMAR SPREJA ZA UHO

Poput svih lijekova, Otomar sprej za uho može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Otomar spreja za uho vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti u obliku svrbeža ili peckanja ušnog kanala.

Ako ste primijetili navedenu nuspojavu ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Otomar sprej za uho i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI OTOMAR SPREJ ZA UHO

Otomar sprej za uho čuvajte dobro zatvoren, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Otomar sprej za uho se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 2 mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Otomar spreja za uho i sadržaj pakiranja

Otomar sprej za uho je bistra, bezbojna otopina. 10 mL otopine u plastičnoj (HDPE) bočici s plastičnim (PP) nastavkom za raspršivanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Jedan potisak spreja sadržava 0,1 mL otopine.

Sastav:

izopropilni alkohol; voda, pročišćena; acetatna kiselina, ledena

Način izdavanja

Otomar sprej za uho dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00892/1