

Permogel, gel — 50 g

10 mg/g ————— permetrin (25:75)

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Permogel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Permogel
3. Kako upotrebljavati Permogel
4. Koji su neželjeni učinci Permogela
5. Kako čuvati Permogel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE PERMOGEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Permogel sadržava djelatnu tvar permetrin. Permetrin je sintetički insekticid iz skupine piretroida, djeluje protiv širokog spektra nametnika uključujući uši, krpelje, buhe, grinje i druge člankonošce. Djeluje kao neurotoksin vežući se na natrijeve kanale živčanih stanica, što posljedično dovodi do paralize nametnika.

Permogel je indiciran kod ušljivosti glave i stidne ušljivosti.

Ušljivost glave je infestacija vlasišta s parazitom *Pediculus humana capitis*, koji se čvrsto veže za površinu dlake te siše krv domaćina. Najčešće područje infestacije su sljepoočnice, područje iza ušiju i zatiljak.

Stidna ušljivost je infestacija pubične i perianalne regije parazitom *Phthirus pubis*, iako mogu biti zahvaćene i druge površine tijela. Glavni simptom bolesti je intenzivan svrbež na mjestu infestacije parazita, dok su dlake posute sitnim bjelkastim tvorbama. Ušljivost se prenosi bliskim tjelesnim kontaktom (izravan dodir glave o glavu, spolni odnos, dijeljenje kreveta, korištenje zajedničkih predmeta).

S obzirom da se ušljivost brzo širi unutar kućanstva i drugih zajednica, potrebno je da zaražena osoba ne dijeli osobne stvari, odjeću i posteljinu s ostalim nezaraženim ukućanima.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI PERMOGEL

Nemojte upotrebljavati Permogel:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na druge sintetičke piretroide ili piretrin
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama

Budite oprezni s Permogelom ako:

Permogel služi samo za vanjsku upotrebu. Koristiti samo na neoštećenoj koži. Nakon upotrebe gela operite ruke.

Treba paziti da Permogel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Za upotrebu kod djece mlađe od 2 godine potrebno se savjetovati s liječnikom/specijalistom. Upotreba kod dojenčadi mlađe od 2 mjeseca nije preporučljiva.

Upotreba Permogela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte istovremeno upotrebljavati druge pripravke sa sličnim djelovanjem na istom području.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Permogel bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Permogela

Permogel sadrži:

- metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
- Mogu uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

- propilenglikol

Permogel sadrži 80 mg propilenglikola po 1 g gela. Propilenglikol može uzrokovati iritacije kože. Nemojte koristiti Permogel na dojenčadi ispod 4 tjedna starosti s otvorenim ranama ili na velikoj površini oštećene kože (npr. opekline) bez konzultacije s liječnikom ili ljekarnikom.

KAKO UPOTREBLJAVATI PERMOGEL

Permogel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Permogel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Za liječenje ušljivosti glave:

Nanesite Permogel na vlažnu kosu. Potpuno prekrijte vlasište pripremkom, prvotno ga nanoseći na područje iza ušiju i na zatiljak.

Zaštitite oči ručnikom kako pripremak ne bi dospio u oči. Ostavite Permogel da djeluje 10 minuta te zatim isperite kosu mlakom vodom. Osušite kosu ručnikom i dobro ju iščešljajte gustim češljem. Iščešljavajte kosu svaka 2 do 3 dana, a vidljive uši uklanjajte pojedinačno rukom.

Ako uočite žive uši 7 do 10 dana nakon prve primjene Permogela, potrebno je ponoviti postupak. Na dan upotrebe Permogela u perilici operite (pri minimalno 50°C) odjeću, posteljinu i ručnike koje koristite. Tkaninu koju ne smijete izlagati visokim temperaturama možete ostaviti u hermetički zatvorenim plastičnim vrećama barem 72 sata.

Za liječenje stidne ušljivosti:

Nanesite Permogel na zahvaćeno pubično područje, ostavite ga da djeluje 10 minuta te zatim isperite mlakom vodom.

Ako uočite žive uši 7 do 10 dana nakon prve primjene Permogela, potrebno je ponoviti postupak.

Parazit se smatra uklonjenim ako 7 dana od primjene Permogela na zahvaćenom području više nema prisutnih živih ušiju.

Ako primijenite više Permogela nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Permogela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Permogel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Permogel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Permogel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI PERMOGELA

Poput svih lijekova, Permogel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Permogela može doći do pojave svrbeža, suhoće kože, crvenila, osjećaja žarenja, trnjenja i peckanja na mjestu upotrebe. Navedeni simptomi češće se pojavljuju kod pacijenata s ozbiljnijom infestacijom grinja i u pravilu su blagi i prolazni.

Druge prolazne nuspojave uključuju nadražaj kože, eritem, edem i osip. Teško je razlučiti jesu li kožne nuspojave posljedica primjene Permogela ili pak prisutnosti samog parazita u koži.

Vrlo rijetko se mogu javiti glavobolja, bol u trbuhu, proljev, mučnina i povraćanje.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Permogel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI PERMOGEL

Permogel čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Permogel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Permogela i sadržaj pakiranja

Permogel je bijeli gel karakterističnog mirisa. 50 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 10 mg permetrina (25:75)

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; propilenglikol; karbomeri; trolamin; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat

Način izdavanja

Permogel se izdaje na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00611/1