

Pilokarpin kapi za oko, otopina 1%, 2% ——— 10 g

10 mg/g	_____	<i>pilokarpinklorid</i>
20 mg/g	_____	<i>pilokarpinklorid</i>

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Pilokarpin kapi za oko i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko
3. Kako upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko
4. Koji su neželjeni učinci Pilokarpin kapi za oko
5. Kako čuvati Pilokarpin kapi za oko
6. Dodatne informacije

ŠTO SU PILOKARPIN KAPI ZA OKO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Pilokarpin pripada skupini parasimpatomimetika jakog djelovanja (stimulator muskarinskih receptora).

Ukapan u oko izaziva kontrakciju zjeničnog sfinktera i zrakastog mišića, sužava zjenicu i proširuje pore trabekularnog sustava. Time se olakšava otjecanje očne vodice i snižava se očni tlak. Pri napadaju akutnog glaukoma pilokarpin svojim miotičkim djelovanjem oslobađa trabekularni sustav od priljubljene šarenice pa se uspostavlja normalan protok očne vodice uz sniženje očnog tlaka. Pilokarpin dobro i vrlo brzo (5 minuta) prodire kroz rožnicu u unutrašnjost oka. Mioza počinje nakon 10 minuta, maksimalna je 40–60 minuta nakon ukapavanja, a može trajati do 8 sati. Učinak na tlak je nešto kraći i iznosi 3–4 sata.

Ovisno o težini bolesti, odnosno o visini očnog tlaka i lokalnoj podnošljivosti, koriste se otopine različitih koncentracija. Pilokarpin smanjuje očni tlak za 10–40% početne vrijednosti.

Pilokarpin kapi za oko indicirane su:

- kod kroničnog glaukoma širokog i uskog kuta
- kod akutnog glaukoma uskog kuta
- za smanjenje intraokularnog tlaka prije operacije
- za otklanjanje sinehija između šarenice i leće naizmjenično s midrijaticima
- kod indukcije mioze, tj. otklanjanja midrijaze uzrokovane pripravicima koji izazivaju cikloplegiju (stanja poslije operacije oka ili oftalmoskopije)

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI PILOKARPIN KAPI ZA OKO

Nemojte upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod akutnog iridociklitis
- kod stanja pupilarnog bloka
- kod nekih oblika sekundarnog glaukoma
- kod jake miopije u mlađih osoba
- kod oštećenja retine

Budite oprezni s Pilokarpin kapima za oko ako imate:

- gastrointestinalne grčeve, ulkus želuca
- srčane bolesti, hipertenziju
- astmu
- Parkinsonovu bolest
- hipertireoidizam
- opstrukciju urinarnog trakta

Prilikom upotrebe Pilokarpin kapi za oko potrebno je ukloniti kontaktne leće iz oka. Izravan dodir kontaktnih leća s kapima treba izbjegavati zbog mogućeg zamućenja. Pričekajte barem 15 minuta od primjene Pilokarpin kapi zatim vratite kontaktne leće u oko.

Upotreba Pilokarpin kapi za oko s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Ako dođe do sistemske apsorpcije pilokarpin može pojačati učinak alkohola i antikolinesteraza te umanjiti učinak antikolinergika.

Učinak pilokarpina može biti pojačan primjenom antikolinesteraza, fenotiazina, MAO inhibitora, antihistaminika, tricikličkih antidepressiva. Adrenergički blokatori mogu umanjiti učinak pilokarpina.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Pilokarpin kapi za oko

Pilokarpin kapi za oko sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,1 mg benzalkonijevog klorida po 1 g otopine.


Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća.

Benzalkonijev klorid može također uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaj rožnice (prozirni sloj prednjeg dijela oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

KAKO UPOTREBLJAVATI PILOKARPIN KAPI ZA OKO

Pilokarpin kapi za oko uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj. Nakon otvaranja bočice, zatvarač treba ostati u ruci s otvorom okrenutim prema dolje.

Slika 2. U sjedećem ili ležećem položaju, nagnite glavu unatrag i laganim stiskanjem bočice ukapajte jednu kap u donju konjunktivnu vrećicu oka. Pogledajte prema dolje i lagano zatvorite oko 1 do 2 minute. Blagim pritiskom prsta na kut oka kod nosa možete smanjiti otjecanje lijeka iz oka. Pokušajte ne treptati i nemojte trljati oko. Vratite zatvarač na bočicu i dobro je zatvorite.

Prije upotrebe kapi operite ruke. Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za oko smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati oko kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj.

Najčešće doziranje Pilokarpin kapi za oko je 1 kap u konjunktivnu vrećicu, 2-3 puta dnevno.

Akutni glaukom uskog kuta

Ukapavanje 1% ili 2% otopine ponavlja se do 3 puta unutar perioda od 30 minuta.

Indukcija mioze

Ukapava se po 1 kap 1% ili 2% otopine svakih 5 minuta dok se ne postigne mioza.

Ako primijenite više Pilokarpin kapi za oko nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za oko od propisane obilno isperite oko vodom i obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Pilokarpin kapi za oko

Pilokarpin je lijek koji može biti štetan ako se proguta. U slučaju predoziranja ili gutanja lijeka, posebno kod djece, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Pilokarpin kapi za oko i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Pilokarpin kapi za oko

Ako ste zaboravili upotrijebiti Pilokarpin kapi za oko kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Pilokarpin kapi za oko kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI PILOKARPIN KAPI ZA OKO

Poput svih lijekova, Pilokarpin kapi za oko mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon ukapavanja Pilokarpin za oko vrlo rijetko se može pojaviti reakcija preosjetljivosti sa simptomima kao što su svrbež, bol, pečenje, pojačano izlučivanje suza, cilijarni spazam, konjunktivna vaskularna kongestija, crvenilo kapaka, kratkovidnost (miopija) i alergijski konjunktivitis.

Sustavne reakcije moguće su pri liječenju akutnog napadaja glaukoma (razmjerno visoke doze u kratkom vremenu), a iznimno su rijetke pri liječenju kroničnog glaukoma.

Pri dugotrajnoj upotrebi može doći do zamućenja leće, aktivacije latentnog iritisa ili uveitisa (upalnih procesa u oku). Vrlo rijetko se mogu pojaviti i sustavni parasimpatomimetički učinci pri upotrebi propisanih doza (znojenje, slinjenje, mučnina, glavobolja, proljev, povraćanje, povišeni krvni tlak, ubrzan rad srca, suženje bronha, plućni edem i mišićni tremor). Također, često se može pojaviti i glavobolja.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Pilokarpin kapi za oko i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI PILOKARPIN KAPI ZA OKO

Pilokarpin za oko čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Pilokarpin kapi za oko se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice je 30 dana.

Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Pilokarpin kapi za oko i sadržaj pakiranja

Pilokarpin kapi za oko su bistra, bezbojna otopina. 10 g otopine u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g otopine Pilokarpin 1% kapi za oko sadržava 10 mg pilokarpinklorida

1 g otopine Pilokarpin 2% kapi za oko sadržava 20 mg pilokarpinklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev klorid; dinatrijev edetat; benzalkonijev klorid; natrijev hidroksid

Način izdavanja

Pilokarpin kapi za oko dostupne su na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00621/1