

Skabigel, gel — 50 g

50 mg/g ————— permetrin (25:75)

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Skabigel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Skabigel
3. Kako upotrebljavati Skabigel
4. Koji su neželjeni učinci Skabigela
5. Kako čuvati Skabigel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE SKABIGEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Skabigel sadržava djelatnu tvar permetrin. Permetrin je sintetički insekticid iz skupine piretroida, djeluje protiv širokog spektra nametnika uključujući uši, krpelje, buhe, grinje i druge člankonošce.

Skabigel se upotrebljava kod svraba (scabies). Svrab je infestacija kože grinjom (*Sarcoptes scabiei*), ljudskim parazitom koji se ukopava ispod površine kože te na taj način dovodi do razvoja simptoma. Glavni simptom bolesti je intenzivan svrbež (naročito noću) uz lokalno crvenilo (eritem) koje se pojavljuje na mjestima svrbeža.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI SKABIGEL

Nemojte upotrebljavati Skabigel:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na druge sintetičke piretroide ili piretrin
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama

Budite oprezni sa Skabigelom

Skabigel služi samo za vanjsku upotrebu. Nakon upotrebe gela operite ruke. Treba paziti da Skabigel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Za upotrebu kod djece mlađe od 2 godine potrebno se savjetovati s liječnikom/specijalistom. Upotreba kod dojenčadi mlađe od 2 mjeseca nije preporučljiva.

Upotreba Skabigela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Kortikosteroidi se ne bi smjeli upotrebljavati istodobno s permetrinom jer mogu pogoršati infestaciju grinja zbog svog negativnog utjecaja na obrambeni sustav kože.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Skabigel bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Skabigela

Skabigel sadrži:

- metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
- Mogu uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

- propilenglikol

Skabigel sadrži 80 mg propilenglikola po 1 g gela. Propilenglikol može uzrokovati iritacije kože. Nemojte koristiti Skabigel na dojenčadi ispod 4 tjedna starosti s otvorenim ranama ili na velikoj površini oštećene kože (npr. opekline) bez konzultacije s liječnikom ili ljekarnikom.

KAKO UPOTREBLJAVATI SKABIGEL

Skabigel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Skabigel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Nanesite Skabigel na suhu i hladnu kožu (ne odmah nakon tuširanja).

Temeljito utrljajte Skabigel na kožu od glave do stopala. Svrab rijetko zahvaća vlasište odraslih, iako se može pronaći kod djece i starijih osoba.

Kada se Skabigel upotrebljava kod djece potrebno ga je nanijeti na kosu, čelo i sljepoočnice.

Posebno nanesite Skabigel između prstiju stopala i ruku te ispod noktiju.

Za odraslu osobu je dovoljno oko 30 g Skabigela.

Za djecu od 5 do 12 godina uobičajena doza iznosi 15 g Skabigela, dok djeca od 2 do 5 godina u prosjeku trebaju 7,5 g Skabigela.

Nakon 8–14 sati isperite Skabigel tuširanjem ili kupanjem.

Ako Skabigel isperete s kože ranije, potrebno ga je nanijeti ponovno.

Najčešće je Skabigel dovoljno nanijeti samo jednom da se ukloni uzročnik, a po preporuci liječnika cijeli se postupak može ponoviti nakon tjedan dana.

Svrbež može potrajati i 3 tjedna nakon liječenja, a ako simptomi ne nestanu 6 tjedana nakon liječenja potrebno je kontaktirati liječnika.

Na dan upotrebe Skabigela u perilici operite (pri minimalno 50°C) odjeću, posteljinu i ručnike koje koristite. Tkaninu koju ne smijete izlagati visokim temperaturama možete ostaviti u hermetički zatvorenim plastičnim vrećama barem 72 sata.

Ako primijenite više Skabigela nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Skabigela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Skabigel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Skabigel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Skabigel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI SKABIGELA

Poput svih lijekova, Skabigel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Skabigela može doći do pojave svrbeža, suhoće kože, crvenila, osjećaja žarenja, trnjenja i peckanja na mjestu upotrebe. Navedeni simptomi češće se pojavljuju kod pacijenata s ozbiljnijom infestacijom grinja i u pravilu su blagi i prolazni.

Druge prolazne nuspojave uključuju nadražaj kože, eritem, edem i osip.

Vrlo rijetko se mogu javiti glavobolja, bol u trbuhu, proljev, mučnina i povraćanje.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Skabigel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI SKABIGEL

Skabigel čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Skabigel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Skabigela i sadržaj pakiranja

Skabigel je bijeli gel karakterističnog mirisa. 50 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 50 mg permetrina (25:75)

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; propilenglikol; trolamin; karbomeri; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat

Način izdavanja

Skabigel je dostupan na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02130/2