

Urotropin gel

30 g

150 mg/g

metenamin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Urotropin gel i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Urotropin gel
3. Kako upotrebljavati Urotropin gel
4. Koji su neželjeni učinci Urotropin gel
5. Kako čuvati Urotropin gel
6. Dodatne informacije

ŠTO JE UROTROPIN GEL I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Urotropin gel se koristi za smanjenje prekomjernog znojenja. Prekomjerno znojenje je posljedica povećane aktivnosti žlijezda znojnice. Metenamin uravnotežuje pretjeranu aktivnost žlijezda znojnice. Oblik gel je najprikladniji oblik za upotrebu na koži jer omogućava brzu i potpunu raspodjelu lijekovite tvari, lako se nanosi, a pritom ne masti odjeću i ne ostavlja mrlje.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI UROTROPIN GEL

Nemojte upotrebljavati Urotropin gel:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku. Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na formaldehid
- na sluznicama oka, usta i nosa
- na oštećenoj koži, koži s osipom, ranama i opekotinama

Budite oprezni s Urotropin gelom

Urotropin gel služi samo za vanjsku upotrebu. Koristiti samo na zdravoj koži. Ne smije se nanositi na lice. Nakon upotrebe gela operite ruke. Ako je pretjerano znojenje simptom neke bolesti, potrebno se obratiti liječniku.

Treba paziti da Urotropin gel ne dospije u oči. Ako se to ipak dogodi, oči treba ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta, a očne kapke držati otvorenima.

Upotreba Urotropin gela s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Urotropin gel bez preporuke liječnika.

Važne informacije o nekim sastojcima Urotropin gela

Urotropin gel sadrži:

- metilparahidroksibenzoat

Može uzrokovati alergijsku reakciju (odgođenu).

KAKO UPOTREBLJAVATI UROTROPIN GEL

Urotropin gel uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Urotropin gel posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Nanesite gel na čiste i suhe dijelove tijela koji se pretjerano znoje (stopala, dlanovi, pazusi) jednom dnevno, najbolje navečer.

Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 7 dana, potrebno je napraviti pauzu od 20 dana. Ako je potrebno, Urotropin gel može se ponovno primjenjivati nakon pauze.

Ako primijenite više Urotropin gel nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu gela od propisane odstranite višak papirnatom maramicom.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Urotropin gela

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Urotropin gel i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Urotropin gel

Ako ste zaboravili upotrijebiti Urotropin gel kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI UROTROPIN GELA

Počet svih lijekova, Urotropin gel može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon upotrebe Urotropin gela može doći do pojave blagog crvenila, osjećaja žarenja i osipa na mjestu upotrebe. U nekim slučajevima može doći do lokalne iritacije kože, pogotovo kod osoba s kontaktnom alergijskom reakcijom na formaldehid.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Urotropin gel i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI UROTROPIN GEL

Urotropin gel čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.
Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!
Urotropin gel se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Urotropin gela i sadržaj pakiranja

Urotropin gel je proziran gel karakterističnog mirisa. 30 g gela u aluminijskoj tubi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g gela sadržava 150 mg metenamina

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; glicerol; karbomeri; metvica paprena, eterično ulje; metilparahidroksibenzoat

Način izdavanja

Urotropin gel dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

00939/1