

Zolin sprej za nos, otopina

10 mL

0,5 mg/mL / 50 mg/mL
1 mg/mL / 50 mg/mL

ksilometazolinchlorid/dekspantenol
ksilometazolinchlorid/dekspantenol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Zolin sprej za nos i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Zolin sprej za nos
3. Kako upotrebljavati Zolin sprej za nos
4. Koji su neželjeni učinci Zolin spreja za nos
5. Kako čuvati Zolin sprej za nos
6. Dodatne informacije

ŠTO JE ZOLIN SPREJ ZA NOS I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Djelatne tvari u Zolin spreju za nos su ksilometazolinchlorid i dekspantenol. Ksilometazolinchlorid je simpatomimetik koji smanjuje otečenost sluznice stezanjem krvnih kapilara u sluznici nosa. Smanjena otečenost sluznice dovodi do manje začepljenosti nosa, olakšanog istjecanja sekreta i nesmetanog disanja. Dekspantenol je derivat pantotenske kiseline, vitamina koji potiče cijeljenje rana i štiti sluznicu nosa.

Zolin sprej za nos upotrebljava se za simptomatsko liječenje rinitisa i sinusitisa, za dekongestiju Eustahijeve tube kod upale uha te za poticanje cijeljenja oštećene kože i sluznica. Također se upotrebljava za zaustavljanje krvarenja iz nosa i pripremu za preglede ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ZOLIN SPREJ ZA NOS

Nemojte upotrebljavati Zolin sprej za nos:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi-alergični na druge simpatomimetike
- ako imate suhu upalu nosne sluznice s posljedičnim nastankom krasta (rinitis sicca)
- ako imate glaukom zatvorenog kuta
- kod djece ispod ispod 2 godine (0,5 mg/mL / 50 mg/mL), odnosno ispod 6 godina (1 mg/mL / 50 mg/mL)

Budite oprezni s Zolin sprejom za nos ako:

- uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitori) ili druge lijekove koji mogu povišiti arterijski krvni tlak
- imate povišen očni tlak, osobito glaukom uskog kuta
- imate tešku kardiovaskularnu bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija)
- imate metaboličke poremećaje (hipertireoza, dijabetes, porfirija)
- imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- imate povećanu prostatu

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do reaktivne hiperemije- pojave povratnog učinka („rebound effect“) i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Zolin spreja za nos. Također, dugotrajna ili prekomjerna upotreba može dovesti do kronične kongestije i atrofije sluznice.

Upotreba Zolin spreja za nos s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Istovremena upotreba Zolin spreja za nos s određenim lijekovima za depresiju (triciklički antidepresivi ili MAO inhibitori), kao i s lijekovima za sniženje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), može dovesti do porasta krvnog tlaka.

Istodobna upotreba Zolin spreja za nos sa srčanim glikozidima (digoksinom) može povećati rizik nastanka nepravilnosti u srčanom ritmu.

Uzimanje Zolin spreja za nos s lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. bromokriptin) može dovesti do aditivne kardiovaskularne toksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi Zolin spreja za nos kod trudnica i dojilja. Iz tog razloga Zolin sprej za nos se ne smije upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik smatra da je neophodno. U tom slučaju Zolin sprej za nos treba upotrebljavati kratko vrijeme i u najnižoj dozi.

Važne informacije o nekim sastojcima Zolin spreja za nos

Zolin sprej za nos sadrži:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 mL otopine.

Benzalkonijev klorid može uzrokovati nadražaj ili oticanje sluznice u nosu, osobito kada se koristi duže vrijeme.

Dugotrajne primjena može uzrokovati edem sluznice nosa.

KAKO UPOTREBLJAVATI ZOLIN SPREJ ZA NOS

Zolin sprej za nos uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Zolin sprej za nos posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.


Osim ako nije drugačije propisano od strane liječnika, način upotrebe je:

DOB	ZOLIN sprej za nos	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca od 2 do 6 godina	0,5 mg/mL / 50 mg/mL	1 potisak	3 puta po 1 potisak
Djeca starija od 6 godina i odrasli	1 mg/mL / 50 mg/mL	1 potisak	3 puta po 1 potisak

Kod krvarenja iz nosa tampon od gaze natopljen otopinom uvesti u nosnicu i ostaviti 2-5 minuta.

Način upotrebe

Prije upotrebe Zolin spreja za nos, lagano ispušite nos.



Slika 1. Skinite zaštitni poklopac. Bijeli nastavak pritisnite nekoliko puta dok se ne pojavi prvi mlaz. Nakon toga je bočica spremna za raspršivanje i upotrebu.



Slika 2. Vrh nastavka za nos stavite u nosnicu, pumpicu pritisnite jedan put i lagano udahnite kroz nos. Pri tom bočicu držite uspravno, a glavu ne zabacujte unatrag. Na kraju popustite pritisak na raspršivač i ponovite postupak s drugom nosnicom.

Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu spreja za nos smije koristiti samo jedna osoba. Nakon upotrebe vrh raspršivača obrišite i zatvorite priloženim poklopcem. Nemojte koristiti Zolin sprej za nos češće nego li je preporučeno niti duže od 5 dana. Ako se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju u roku od 5 dana, potrebno je prekinuti primjenu spreja i potražiti savjet liječnika. Ukoliko je produženo liječenje neophodno, treba ga nastaviti nakon pauze od 3 do 5 dana.

Ako primijenite više Zolin spreja za nos nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu spreja za nos od propisane obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Simptomi predoziranja su nemir, agitacija, midrijaza, podrhtavanje ruku, bljedo kože, mučnina, povraćanje, pospanost, glavobolja, hipertenzija, tahikardija. Unos jako velike količine Zolin spreja za nos može uzrokovati hipotenziju, bradikardiju i hipotermiju. Kod djece, posebno mlađe od 1 godine, može doći i do poremećaja svijesti te kome.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Zolin spreja za nos

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Zolin sprej za nos i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Zolin sprej za nos

Ako ste zaboravili upotrijebiti Zolin sprej za nos kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Zolin spreja za nos kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ZOLIN SPREJA ZA NOS

Poput svih lijekova, Zolin sprej za nos može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Upotrebom Zolin spreja za nos može doći do alergijske reakcije praćene osipom, svrbežom te oticanjem kože i sluznica. Zolin sprej za nos može izazvati lokalni nadražaj sluznice praćen lokalnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće. Može izazvati i neke sistemske nuspojave kao što su glavobolja, omaglica, poremećaj svijesti, hipertenzija, palpitacije, tahikardija, nemir, umor, mučnina, slabost, pad tjelesne temperature.

U slučaju dugotrajne ili prekomjerne upotrebe može doći do reaktivne hiperemije– pojave povratnog učinka („rebound effect“) i sužavanja nosnih hodnika, što za posljedicu ima opetovano korištenje Zolin spreja za nos. Također, dugotrajna ili prekomjerna upotreba može dovesti do kronične kongestije i atrofije sluznice.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Zolin sprej za nos i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI ZOLIN SPREJ ZA NOS

Zolin sprej za nos čuvajte dobro zatvoren, u originalnom pakiranju. Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece! Zolin sprej za nos se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja spreja je 2 mjeseca. Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Zolin spreja za nos i sadržaj pakiranja

Zolin sprej za nos je bistra, bezbojna otopina. 10 mL otopine u plastičnoj (HDPE) bočici s plastičnim sustavom za raspršivanjem i zaštitnom kapicom, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine Zolin 0,5 mg/mL / 50 mg/mL spreja za nos sadržava 0,5 mg ksilometazolinklorida i 50 mg deksantenola
1 mL otopine Zolin 1 mg/mL / 50 mg/mL spreja za nos sadržava 1 mg ksilometazolinklorida i 50 mg deksantenola

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; benzalkonijev klorid

Način izdavanja

Zolin sprej za nos dostupan je bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

02420/1